

Выводы. Как и все другие вирусы, вирус SARS-COV-2, вызывающий COVID-19, продолжит эволюционировать в течение всего времени своего распространения. Чем интенсивнее распространяется вирус, тем больше факторов, способствующих его изменению. Поэтому избежать дальнейшего появления новых вариантов можно, остановив распространение вируса. [1]

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией за январь 2022 г. на 207 человек (15.2%) больше, чем за ноябрь 2021 г. У женщин симптомы проявлялись чаще, чем у мужчин: за ноябрь 2021 г. – на 62 человека (10.8%), январь 2022г. – на 133 человека (16%).

Общая симптоматика за январь 2022 г. на 136 человек (5.4% от общего количества симптомов) превысила показатели за ноябрь 2021г. А именно: температура тела – на 53 человека больше (11.8%), боль в горле – на 148 человек (32.9%), заложенность носа – на 6 человек (1.3%), насморк – на 58 человека (12.9%), заложенность ушей – на 4 человека (0.9%), осиплость голоса – на 24 человека (5.3%). Однако такие показатели, как аносмия и авгезия, были выше за ноябрь 2021 г. на 134 человека (29.8%) и 23 человека (5.1%) соответственно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)-variants-of-sars-cov-2/](https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-variants-of-sars-cov-2/). – Дата доступа: 08.01.2022.

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения РБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/v-belarus-prishel-novyy-variant-koronavirusa-omikron/>. – Дата доступа: 29.12.2021.

ВАРИАНТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМОЙ ПОМОЩИ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ

Ягелло К. Г., Калесник М. В.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: д.м.н. доцент Якубцевич Р. Э.

Актуальность. Дать оценку качества оказываемой помощи, как в отделении реанимации, так и в медицине в целом, требует значительных усилий. Одним из более доступных и простых методов является опрос пациентов. При проведении анализа полученных результатов можно на раннем этапе разработать мероприятия по устранению всех недочетов, что в дальнейшем помогает повысить уровень оказываемой помощи. [1]

Цель. Разработать анкету, которая позволит оценить качество оказанной медицинской помощи в отделении реанимации и с помощью нее провести анкетирование пациентов, находящихся в данном отделении.

Методы исследования. Нами составлена анкета, с помощью которой был проведен опрос 40 пациентов онкологического профиля. Пациенты проходили лечение в отделении реанимации УЗ «ГУК» г. Гродно.

Результаты и их обсуждение. При оценивании уровня удовлетворенности пациентов оказанием помощи были получены следующие результаты: 38 пациентов (96%) довольны оказанной им помощи, а 1 (4%) – нет. Измерение уровня боли по системе ВАШ, уровень боли 0-2 указало 7 человек (28%), и в дополнительной анальгезии они не нуждались. Боль в 3 балла оценили 8 пациентов (32%), в 4 балла – 5 человек (20%), 5-6 баллов по ВАШ отметили 5 пациентов (20%). Данные пять человек нуждались в дополнительной анальгезии, что можно связать с сопутствующей хирургической патологией.

В разделе «Качество сна» 30 пациентов (75%) указало, что в отделении трудно было соблюдать режим сна и бодрствования. 6 человек (15%) ночью примерно просыпались до 3 раз, а 18 человек (45%) – 4 и более раз за ночь. После отдыха усталость присутствовала у 30 пациентов. Из причин, которые мешали пациентам отдохнуть, указаны следующие: присутствие в отделении постоянного света и шума (8 человек (20%)), отсутствие мягкой подушки (7 человек (17,5%)), твердый матрас (2 человека (5%)), боль с постоянным характером (6 пациентов (15%)).

В разделе «Физическая активность» желание к выполнению физических упражнений отметило 26 пациентов (56%), но у 33 человек при этом был страх к самостоятельному выполнению. В вопросе «В чьей помощи вы нуждаетесь при выполнении упражнений» «медицинский персонал» указало 18 человек (54,5%), а «в помощи родственников» – 15 пациентов (45,5%).

В разделе «Общение». 36 человека (90%) отметило, что хотели бы увидеть родных в отделении реанимации, 4 пациента (10%) – нет. На вопрос «Если бы у ваших родных была возможность попасть в отделение, чем бы они вам помогли?» были получены следующие ответы: помощь в физической активности указало (15 человек (37,5%)), общение (12 пациентов (30%)), а помощь в еде понадобилась бы 9 пациентам (22,5%). Так же необходимо отметить, что пациенты, находившиеся в отделении, были лишены возможности увидеть родных и лично поговорить с ними по телефону, что вызывало у них обеспокоенность.

Выводы. Анкета-опросник позволяет получить информацию о качестве оказанной помощи, а выявление проблем служит началом для разработки мероприятий по их устранению и, таким образом, позволяет усовершенствовать уровень оказания помощи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Калесник М.В. Оценка удовлетворенности пациенток, перенесших спинальную анестезию при кесаревом сечении/ М. В. Калесник// Сборник материалов конференции студентов и молодых ученых, посвященных 80-летию со дня рождения профессора Болтрукевича С.И., май 2020 г. – Гродно, 2020. – С. 210-211.