

ЛИТЕРАТУРА

1. Association of MTHFR Polymorphisms with H-Type Hypertension: A Systemic Review and Network Meta-Analysis of Diagnostic Test Accuracy / Y. Kong [et al.] // Int J Hypertens. – 2022. – P. 1–7.
2. Association between MTHFR Polymorphisms and the Risk of Essential Hypertension: An Updated Meta-analysis / H. Meng [et al.] // Front Genet. – 2021. – Vol. 12. – P. 1–19.
3. Association between methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T/A1298C polymorphisms and essential hypertension: a systematic review and meta-analysis / Y. L. Wu [et al.] // Metabolism. – 2014. – Vol. 63 (12). – P. 1503–1511.
4. Артериальная гипертензия и полиморфизм C677T гена метилентетрагидрофолатредуктазы / О. С. Павлова [и др.] // Кардиология. – 2018. – Т. 58, № 10. – С. 5–11.

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ И УРОВНЯ ДЕПРЕССИВНОСТИ

Лукьянчик Е. Ю.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Кудашевич Д. В.

Актуальность. У каждого человека своё видение на ситуации, создание жизни и мира. Одни верят в теорию Дарвина, другие – в теорию вмешательства, третьи – в теорию творения. Последняя представляет собой теорию, согласно которой человека создал Бог «по образу и подобию своему» из небιологического материала.

Религия позволяет человеку адаптироваться к происходящему вокруг него, найти ответы на возникающие вопросы, способствует его формированию как личности. Религия укрепляет веру человека, которая объединяет в себе его устойчивые представления об окружающей действительности.

Депрессия – это состояние падения. Она возникает оттого, что душа не имеет мира с собой, с Богом или людьми. Это состояние конфликта, внутреннего разрыва между душой и разумом, отсутствие равновесия. Депрессия означает в первую очередь отсутствие любви. Люди страдают, когда не могут найти вокруг себя принюта в душах других. Когда люди не могут найти бескорыстной поддержки со стороны себе подобных, они обескураживаются и в отношениях с Богом, им уже трудно представить себе Бога любящим. Однако если люди предают, поскольку они немощны, то Бог – единственный, Кто не предаёт никогда [1].

Цель. Выявить и описать характер взаимосвязи между уровнем религиозности и депрессивностью у лиц разного возраста.

Методы исследования. Для сбора эмпирических данных использовались шкала депрессии Бека и тест для определения структуры индивидуальной религиозности Ю.В.Щербатых. Обработка проводилась с помощью корреляционного анализа по Пирсону.

Эмпирическую базу составили 40 испытуемых разного возраста от 14 до 55 лет (20 женщин и 20 мужчин), среди них – студенты ГрГМУ, студенты Военной академии РБ, ученики воскресной школы, прихожане и церковнослужители прихода храма святого благоверного князя Александра Невского г. Барановичи.

Результаты и их обсуждение. В ходе эмпирического исследования было установлено: в шестой шкале, которая определяет у испытуемого тенденцию верить в творца и признавать существование высшей силы, создавшей мир, получена отрицательная корреляция ($R = -0,32$).

Выводы. Чем выше уровень религиозности у человека, тем меньше уровень депрессивности.

Верующие люди реже тревожатся о будущем, так как понимают, что их судьба находится в руках справедливого и человеколюбивого Бога. Также они менее раздражительны и более принимающе относятся к себе и другим людям, они спокойны, решительны, смотрят на свою жизнь и на происходящее позитивно, реже страдают от суицидальных мыслей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Митрополит Иерофей (Влахос). Православная психотерапия. – СТСЛ, 2018. – 368 с.

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Лукьянчик К. И., Шатова С. Ю.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хильмончик Н. Е.

Актуальность. Возрастающая распространенность сахарного диабета (СД) среди беременных приводит к высокой вероятности развития осложнений и неблагоприятных исходов у матери и плода. Гестационный сахарный диабет (ГСД) – заболевание, характеризующееся гипергликемией, впервые выявленной во время беременности. Несмотря на то, что тенденция к развитию гестационного сахарного диабета (ГСД) снизилась, заболевание по-прежнему остается распространенным среди беременных [1].

Цель. Провести анализ акушерских и неонатальных исходов по гестационному сахарному диабету, оценить влияние на плод и мать.