

Уровень костной ткани вокруг всех установленных имплантатов (n=30) не снизился более чем на 1,2 мм за 24 месяца наблюдений.

Тщательная мотивация и профессиональная подготовка позволила достичь успеха дентальной имплантации у 80% пациентов в сроки наблюдения 2 года.

Бобкова И.Л., Зиновенко О.Г.
Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Минск, Беларусь

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА

Актуальность. У пациентов с хроническим генерализованным периодонтитом зачастую встречаются признаки орального дисбактериоза, меняется видовой состав микрофлоры полости рта и содержимого периодонтальных карманов, изменяется чувствительность микроорганизмов к антибактериальным и антисептическим препаратам, снижается местный иммунитет.

Цель. Оценка отдаленных результатов применения разработанного комплексного метода сочетанного лечения хронического периодонтита.

Методы исследования. После проведения базовой терапии, в карманы вводили лекарственное средство с содержанием *L. acidophilus* 10⁶ КОЕ/мл (УП «Диалек», Республика Беларусь).

Препарат вносили в каждый периодонтальный карман с экспозицией 5 минут троекратно. Общее время воздействия пробиотика в области одного кармана составляло 15 минут. Затем осуществляли облучение. Излучатель – аппарат «Вектор -03» (УП Азгар, Республика Беларусь). Курс лечения 10 сеансов.

Результаты и их обсуждение. На протяжении 2 лет наблюдений гигиеническое состояние полости рта пациентов всех групп оценивалось как «удовлетворительное». По окончании срока наблюдения индекс GI достоверно снизился у пациентов основной группы до 1 [0,92/1,42].

В основной группе значительно увеличилось количество секстантов СРITN «0» с 0 [0/0] до 1 [0/1], что на 78,6% выше, чем в контрольной группе. В основной группе отмечено отсутствие значимого прироста количества секстантов с глубокими карманами.

На протяжении 2 лет наблюдения по поводу обострения ХП стоматолога посетили 44% пациентов основной группы с частотой обращений 0 [0/1] случаев и 100% пациентов и контрольной группы с частотой обращений 1 [1/1] случаев. Использование метода позволило снизить частоту обращений на 64,5%.

Богданова М.А., Нечай С.В., Булай А.А., Петерсон Н.Л.
Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Могилев, Беларусь

ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Актуальность. Под наркоманией понимают болезненное влечение, пристрастие к систематическому употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым нарушениям психических и физических функций организма.

Несмотря на принимаемые государством меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике наркопотребления, проблема наркомании остается острой на территории Республики Беларусь и в Могилевской области, в частности.

Цель. Изучить степень распространенности потребления наркотических веществ в Могилевской области.

Методы исследования. Специалистами УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» было проведено социологическое исследование методом анкетного опроса среди взрослого населения и учащейся молодежи на тему: «Проблема наркомании в современном обществе». Участие в анкетировании приняло 1988 человек: 49,7% – трудоспособное население в возрасте от 18 до 75 лет; 26,6% – учащиеся 9–11-х классов общеобразовательных школ; 10,3% – учащиеся профессионально-технических лицеев и колледжей; 13,4% – студенты вузов.