

В основной группе значительно увеличилось количество секстантов СРІТN «0» с 0 [0/0] до 1 [0/1], что на 78,6% выше, чем в контрольной группе. В основной группе отмечено отсутствие значимого прироста количества секстантов с глубокими карманами.

На протяжении 2 лет наблюдения по поводу обострения ХП стоматолога посетили 44% пациентов основной группы с частотой обращений 0 [0/1] случаев и 100% пациентов и контрольной группы с частотой обращений 1 [1/1] случаев. Использование метода позволило снизить частоту обращений на 64,5%.

---

Богданова М.А., Нечай С.В., Булай А.А., Петерсон Н.Л.  
Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Могилев, Беларусь

## ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

**Актуальность.** Под наркоманией понимают болезненное влечение, пристрастие к систематическому употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым нарушениям психических и физических функций организма.

Несмотря на принимаемые государством меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике наркопотребления, проблема наркомании остается острой на территории Республики Беларусь и в Могилевской области, в частности.

**Цель.** Изучить степень распространенности потребления наркотических веществ в Могилевской области.

**Методы исследования.** Специалистами УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» было проведено социологическое исследование методом анкетного опроса среди взрослого населения и учащейся молодежи на тему: «Проблема наркомании в современном обществе». Участие в анкетировании приняло 1988 человек: 49,7% – трудоспособное население в возрасте от 18 до 75 лет; 26,6% – учащиеся 9–11-х классов общеобразовательных школ; 10,3% – учащиеся профессионально-технических лицеев и колледжей; 13,4% – студенты вузов.

**Результаты и их обсуждение.** В ходе исследования получены следующие результаты:

- более 80% населения Могилевской области считают серьезной проблему наркомании в нашей стране;
  - каждый десятый участник опроса считает, что в его населенном пункте «достать» наркотики не составляет особых сложностей;
  - около 7% населения сталкивалось хоть однажды с распространителями наркотических средств; около 4% получали предложения стать распространителем наркотиков;
  - основными причинами начала потребления наркотических веществ, по мнению респондентов, являются: любопытство, влияние компании, желание расслабиться и др.;
  - с предложениями попробовать наркотик сталкивались 6,8% трудоспособных участников опроса и 5,6% учащейся молодежи. Чаще всего респондентам предлагали курительные смеси («спайс»), марихуану, клей или растворитель и др. Чаще всего такие предложения поступают в компании друзей;
  - 3,5% трудоспособного населения и 1,8% учащейся молодежи имеют в ближайшем окружении людей, употребляющих наркотические вещества;
  - 9,3% трудоспособного населения и 4,2% учащихся признались, что попадали в ситуации, когда в их присутствии употребляли наркотики;
  - 4,3% респондентов из числа трудоспособного населения и 1% молодежи признались в употреблении наркотических веществ. Чаще всего респонденты пробовали курительные смеси, марихуану, клей или растворитель. Около 70% указали, что пробовали наркотик лишь однажды;
  - по мнению большинства взрослого населения, усиление директивных мер сможет иметь преимущественное влияние на изменение ситуации с потреблением наркотиков в белорусском обществе;
  - чаще всего о последствиях потребления наркотиков молодые люди узнают от педагогов, сотрудников милиции и из СМИ;
- Полученные данные должны стать стимулом для разработки новых интересных форм профилактической работы с населением, направленных на обучение адаптивному стилю жизни, навыкам общения, критическому мышлению, умению твердо сказать «нет» на предложения психоактивных веществ.