

ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ СПИНКИ НОСА ОТ ГЕНДЕРНОГО ПРИЗНАКА, ВОЗРАСТА И СЕЗОННОСТИ

Якубчик А. А.¹, Кречик В. В.²

¹Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

²Гродненская университетская клиника, Гродно, Беларусь

Актуальность. Среди всех челюстно-лицевых травм наибольший удельный вес приходится на переломы костей носа 26,2% [1], что обуславливает актуальность.

Цель. Анализ и оценка статистических данных переломов спинки носа с 2017 по 2022 год по историям болезни пациентов УЗ «Гродненская университетская клиника».

Методы исследования. В работе были использованы аналитический, сравнительно-оценочный, эпидемиологический методы.

Результаты и их обсуждение. За период с 2017 по 2022 год выявлено 304 пациента с переломами костей носа.

В 2017 году было 56 переломов, из них на зимний период приходится 12, на весенний - 16, на летний - 15, на осенний-13. При анализе данных установлено, что из 56 человек: 40 - мужчины, 16-женщины.

В 2018 году был 41 перелом, из них на зимний период приходится 8 переломов, на весенний - 12, на летний - 6, на осенний-15. При анализе данных установлено, что из 41 человека: 28 -мужчины, 13-женщины.

В 2019 году было 59 переломов, из них на зимний период приходится 18 переломов, на весенний - 21, на летний - 14, на осенний-6. При анализе данных установлено, что из 59 человек: 28 -мужчины, 13-женщины.

В 2020 году было 37 переломов, из них на зимний период приходится 12 переломов, на весенний - 8, на летний - 11, на осенний-6. При анализе данных установлено, из 37 человек: 23 -мужчины, 14-женщины.

В 2021 году было 62 перелома, из них на зимний период приходится 13 переломов, на весенний - 13, на летний - 18, на осенний-19. При анализе данных установлено, из 62 человек: 45 -мужчины, 17-женщины.

В 2022 году было 49 перелома, из них на зимний период приходится 11 переломов (не учитывая данных за декабрь), на весенний - 17, на летний - 21, данные за осенний период отсутствуют. При анализе данных установлено, из 49 человек: 35 -мужчины, 14-женщины.

По возрастному критерию ВОЗ полученные данные распределились следующим образом: 129 человек младше 18 лет, молодого возраста (от 18 до 44 лет) - 149 человек, среднего возраста (от 45 до 59 лет) -18 человек, пожилого возраста (от 60 до 74 лет) - 6 человек, старческого (от 75 до 90 лет) -1 человек, долгожители (старше 90 лет) -1 человек. На основании полученных сведений было установлено, что из 304 пациентов 71% - мужчины, 29% - женщины. В результате

анализа и оценки данных зависимости между количеством переломов и сезоном года не выявлено. Кроме этого, было установлено, что чаще ломают спинку носа люди молодого возраста, их 49%, затем идут люди младше 18 лет, их 42,4%, после, люди среднего возраста, их 6%, люди пожилого возраста- 2%, люди старческого возраста- 0,3%, и долгожители-0,3%.

Выводы. Чаще всего переломы костей носа отмечались у мужчин молодого возраста и младше 18 лет.

ЛИТЕРАТУРА

1. Умаров, О. М. Общая статистическая характеристика сочетанной травмы челюстно-лицевой области / О. М. Умаров // Врач-аспирант. – 2012. – Т. 50, № 1.1. – С. 221-224.

2. Rhee, S. C. Septal fracture in simple nasal bone fracture / S. C. Rhee, Y. K. Kim, J. H. Cha, S. R. Kang, H. S. Park / Plast Reconstr Surg. – 2004. – Vol. 113, iss. 1. – P. 45-52.

3. Оториноларингология: учебник / О. Г. Хоров, А. Ч. Буцель, В. С. Куницкий [и др.] ; под ред. проф. О. Г. Хорова. – Минск: Новое знание, 2020. – 413с.

СЕЗОННОСТЬ И ГЕНДЕРНЫЙ ПРИЗНАК В РАЗВИТИИ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ

Якубчик А. А.¹, Кулага Е. Я.²

¹Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

²Гродненская университетская клиника, Гродно, Беларусь

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена тем, что данный возбудитель внебольничной пневмонии занимает второе место после *Streptococcus pneumoniae* [1].

Пневмония относится к наиболее частым заболеваниям человека и является одной из ведущих причин смерти от инфекционных болезней.

Распространённость пневмонии у взрослых (≥ 18 лет) составляет 1-11,6%, в старших возрастных группах 25-44%.

Летальность наименьшая у лиц молодого возраста без сопутствующих заболеваний – 1-3%, у пациентов старше 60 лет при наличии сопутствующей патологии, в случаях тяжёлого течения пневмонии – 15-30%.

Цель. Изучение сезонности и гендерного признака в развитии микоплазменной пневмонии.

Методы исследования. В основу положен анализ историй болезни 29 пациентов находившихся на лечении в пульмонологическом отделении УЗ «Гродненская университетская клиника» в период с октября 2015 г. по январь 2020 г.

Результаты и их обсуждение. В январе месяце поступило на лечение 4 пациента (3 женщины, 1 мужчина), в феврале 1 пациент (женщина), в марте 5