

Лазута Г.С.

Городская поликлиника № 3, Гродно, Беларусь

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И АНКЕТИРОВАНИЯ В ХОДЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Актуальность. В текущей ситуации перед государством особо остро встает проблема демографического кризиса и борьбы с ним. Одним из ключевых факторов, необходимых для преодоления кризиса рождаемости является профилактика. Без решения данной задачи дальнейшее развитие государства не представляется возможным. Более того, в случае отсутствия решения означенной проблемы, под угрозой оказывается национальная безопасность страны.

Согласно статистическим данным, в 45% случаев заболевание приводит к осложнениям, а у 48% пациенток отмечаются рецидивы пролапса тазовых органов. Колоссальный уровень медико-социальной значимости пролапса тазовых органов обусловлен двумя факторами: ухудшением качества жизни женщин (в том числе, значительные затруднения при совершении полового акта), у которых наблюдается указанная патология, а также высоким процентом пациенток, имеющих подтвержденный диагноз пролапса тазовых органов, среди женского населения репродуктивного возраста. Отсутствие симптомов на начальной стадии патологии, в процессе развития патологии вызывает нарушение (вплоть до полной блокировки) функций органов мочеполовой системы. Результатом является необходимость совершения в течение календарного года порядка 1 миллиона оперативных вмешательств, в результате которых значительный процент пациенток полностью или частично утрачивают фертильность.

На основании изложенного можно сделать вывод о значимости выявления и лечения пролапса тазовых органов на ранних стадиях развития патологии. Отсюда следует, что ключевым элементом, имеющим фундаментальную значимость в вопросе профилактики ухудшения

репродуктивного здоровья, является диагностика. В свою очередь, в основе диагностирования лежат ежегодные профосмотры (в том числе, выполняемые в рамках диспансеризации) и анкетирование всего женского населения. Помимо индивидуального диагностирования стадии и вида патологии, повсеместное введение профосмотров и анкетирования пациенток позволяет судить об общей клинико-эпидемиологической картине в стране.

Цель. Выполнение анализа клинико-эпидемиологических аспектов пролапса тазовых органов в ходе их диагностики в рамках профосмотров и анкетирования пациенток репродуктивного возраста.

Методы исследования. В ходе выполнения исследования, произведен анализ всех случаев пролапса тазовых органов, диагностированных в рамках профилактических осмотров пациенток в 2022 г., проводившихся в ГУЗ «Городская поликлиника №3 г. Гродно».

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования, проводимого в 2022 г. в ГУЗ «Городская поликлиника № 3 г. Гродно», медицинские профосмотры были проведены у 98,1% женского населения. Число выявленных случаев пролапса тазовых органов составило 311.

Для увеличения степени патологии требуется минимум 3 года, и принимая во внимание высокий процент рецидивов данного заболевания, можно сделать вывод о наличии существенных недостатков в системе диспансеризации, а также неудовлетворительное качество работы акушеров-гинекологов, работающих в ЖК. Есть необходимость радикального изменения сложившейся ситуации путем разработки и внедрения медико-организационных мероприятий, направленных на значительное улучшение качества диагностирования патологий женского репродуктивного здоровья.
