

2019 – 6575 (16%), 2020 – 4719 (13,3%), 2021 – 4642 (10,7%), 2022 – 3332 (8,3%). Подозрений на профессиональное заболевание отмечено у 5 пациентов в 2018 г., у 6 в 2019, 4 в 2020, у 1 в 2021, у 7 в 2022 году. На внеочередной медосмотр направлены в 2018 году 2756 пациентов, в 2019 – 2964, в 2020 – 1949, в 2021 – 1158, в 2022 – 1081.

Таким образом, в 2020 г. отмечается резкое снижение всех рассматриваемых показателей: число осмотренных на предварительных медицинских осмотрах снизилось на 15 951, на периодических – на 19 467, выявлено на 5613 меньше заболеваний, заболеваний впервые – меньше на 1856, внеочередных осмотров проведено меньше на 1470. Данная динамика обусловлена в первую очередь тем, что в начальный период пандемии COVID-19 имелись определенные трудности в организации проведения плановых медицинских осмотров. Для ограничения распространения инфекции Указами Президента Республики Беларусь № 172 и № 442 «О продлении срока действия документов», Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 20.05.2020 № 299 и № 687 от 02.12.2020 проведение медицинских осмотров приостанавливалось, а срок действия предыдущих медицинских осмотров продлевался.

В 2021 г., в сравнении с 2020 г., отмечается положительная тенденция к увеличению всех основных показателей результатов проведения обязательных (предварительных и периодических) и внеочередных медицинских осмотров, установления профессиональных заболеваний. В 2022 г. показатели стабилизируются, при этом все еще не достигают уровня 2019 г.

Могильницкая О.Э.¹, Никольская А.К.²

¹ Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

² Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Гродно, Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТЕЙ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Актуальность. Большое количество родов и частые беременности являются универсальным риском как для матери, так и плода

из-за высокой частоты осложнений беременности, родов, послеродового и неонатального периодов

Цель. Провести анализ течения беременности и родов у многорожавших женщин.

Методы исследования. Проведен сравнительный ретроспективный анализ 47 историй родов многорожавших женщин и 20 историй родов первородящих в родильном доме УЗ «ГКБ СМП г. Гродно».

Результаты и их обсуждение. Наиболее частым осложнением беременности у многорожавших женщин была анемия и встречалась в 2,5 раза чаще, чем у первородящих. Следует отметить, что преимущественно, встречалась анемия легкой степени среди обследованных многорожавших (35,2%), своевременная коррекция которой привела к положительным результатам лечения данной патологии. Второе место по частоте встречаемости занимала преэклампсия. Тяжелая преэклампсия, которая трудно поддавалась коррекции, отмечалась у многорожавших только в сочетании с экстрагенитальной патологией. Плацентарные нарушения у многорожавших встречались на 7,5% реже, по сравнению с первородящими. Угроза прерывания беременности в 45% случаев наблюдалась у первородящих, по сравнению с 10,6% у многорожавших. Кровотечение в III периоде родов и в раннем послеродовом периоде отмечалось у многорожавших в 1,7 раза чаще, чем у первородящих. Субинволюция матки в послеродовом периоде у многорожавших наблюдалась в 27,6% случаев, что в 1,3 раза чаще, чем у первородящих. У первородящих в 45% случаев встречалась гипогалактия, у многорожавших данной патологии не отмечено. Среднее пребывание роженицы в стационаре у многорожавших составил $3,9 \pm 0,675$ дня, у первородящих – $5,8 \pm 1,1$. Таким образом, высокий риск беременности и родов у многорожавших женщин объясняется принадлежностью их к более старшей возрастной группе, повышенной частотой экстрагенитальных заболеваний.
