

## **Выводы.**

1. Ятрогения – это заболевание, обусловленное неосторожными высказываниями или поступками врача, неблагоприятно воздействующими на психику пациента.

2. Прогресс современной медицины привел к тому, что правильные медицинские действия вызывают патологические реакции, требующие современного распознавания, устранения и профилактики. 3. Чтобы спасти человечество от возможных ятрогенных реакций, государству необходимо заботиться в первую очередь об экологии.

## **ЛИТЕРАТУРА**

1. Ятрогения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studfile.net/preview/6886326/page:6/>. – Дата доступа: 02.03.2023.

2. Ятрогения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://detdom-vidnoe.ru/for\\_parents/17395.php](https://detdom-vidnoe.ru/for_parents/17395.php). – Дата доступа: 02.03.2023.

# **КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ИСХОДЫ РИФАМПИЦИН-УСТОЙЧИВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ**

**<sup>1</sup>Санукевич А. В., <sup>2</sup>Солдатова Е. А.**

<sup>1</sup>Гродненский государственный медицинский университет,

<sup>2</sup>Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия»

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Демидик С. Н.

**Актуальность.** Здоровье женщин определяет репродуктивный потенциал страны и является актуальной медицинской проблемой [1]. Синдром зависимости от алкоголя (СЗА) часто способствует тяжелому течению туберкулеза, снижает эффективность его лечения, приводит к инвалидности, увеличивает риск смерти [2, 3, 4].

**Цель.** Оценить клинические аспекты и исходы лечения рифампицин-устойчивого туберкулеза (РУ-ТБ) у пациенток с СЗА.

**Методы исследования.** Проведено клиническое обследование 33 пациенток жительниц Гродненской области с установленными диагнозами РУ-ТБ и СЗА.

Через 24 месяца, после окончания всего курса терапии проведена оценка эффективности лечения с использованием критериев «успешное лечение» – это сумма случаев с исходами «излечение» и «лечение завершено»; «не успешное лечение» – случаи туберкулеза с исходами «неэффективное лечение», «смерть», а также «потеря для последующего наблюдения» [5].

**Результаты и их обсуждение.** Отмечено, что в группе преобладали женщины фертильного – 26 (78,8%) и работоспособного возраста – 30 (90,9%). При поступлении в клинику диагноз инфильтративный туберкулез легких установлен у 18 (54,5%) пациенток, очаговый – у 4 (12,2%), фиброзно-кавернозный туберкулез – у 10 (33,3%). В 21 (63,3%) случае туберкулезное воспаление в легких, характеризовалось наличием полостей распада и/или каверн. Установлено, что 28 (84,8%) женщин ранее лечили туберкулез ( $p < 0,05$ ).

Через 24 месяца после окончания курса терапии установлено, что «успешное лечение» было достигнуто лишь у 14 (42,4%) женщин. «Неэффективное лечение» с сохранением бактериовыделения к концу интенсивной фазы подтверждено у 16 (48,5%) пациенток исследуемой группы. Отмечено также, что 3 (9,1%) женщины из когорты лечения умерли на фоне проводимой химиотерапии.

**Выводы.** По данным проведенной работы, установлено, что к концу основного курса терапии РУ-ТБ пациенток с СЗА исход – «успешное лечение» был достигнут у 42,4% женщин. Низкая частота положительных исходов терапии связана с наличием лекарственной устойчивостью микобактерий и СЗА, высоким процентом фиброзно-кавернозного туберкулеза, низкой приверженностью к терапии.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Демидик, С. Н. Медико-социальные аспекты и результаты лечения туберкулеза женского населения Гродненской области / С. Н. Демидик, С. Б. Вольф, Е. Н. Алексюк // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2020. – Т. 18, № 1. – С. 11–16.

2. Демидик, С. Н. Оценка отдельных результатов лечения пациентов с распространенными формами МЛУ-ТБ с синдромом зависимости от алкоголя / С. Н. Демидик, С. Б. Вольф // Актуальные проблемы туберкулеза: материалы VII межрегиональной научно-практической и учебно-методической конференции с международным участием. – Тверь, 2018. – С. 38–40.

3. Демидик, С. Н. Отдаленные результаты терапии туберкулеза у женщин в Гродненской области [Электронный ресурс] / С. Н. Демидик, С. Б. Вольф // Актуальные проблемы медицины: сб. материалов итоговой научно-практической конференции (28-29 января 2021 г.) / отв. ред. Е. Н. Кроткова. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – Электрон. текст. дан. (объем 12 Мб). – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – С. 247–250.

4. Предварительные результаты терапии МЛУ-ТБ у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя / С. Н. Демидик [и др.] // Материалы республиканской с международным участием научно-практической конференции, посвященной 60-летию Гродненского государственного медицинского университета (28 сентября 2018 г.). – Гродно, 2018. – С. 265–267.

5. Скрыгина, Е. М. Клиническое руководство по диагностике и лечению туберкулеза и его лекарственно-устойчивых форм / Е. М. Скрыгина, Г. Л. Гуревич. – Минск, 2017 – 140 с.