

Семенов А.В.<sup>1</sup>, Буков Я.Ф.<sup>2</sup>, Орлова М.Г.<sup>1</sup>, Ростовцев В.Н.<sup>1</sup>, Писарик В.М.<sup>1</sup>, Кузьмина В.Б.<sup>1</sup>, Санукевич Т.Г.<sup>3</sup>, Тризна Н.М.<sup>2</sup>, Колядич Ж.В.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения, Минск, Беларусь

<sup>2</sup> Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, Минск, Беларусь

<sup>3</sup> Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Минск, Беларусь

## РАК ГОРТАНИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

**Актуальность.** Опухоли гортани выделены в самостоятельную группу, так как они имеют высокую социальную значимость, связанную с инвалидизирующим лечением, которое сопровождается потерей голоса, нарушением коммуникативных функций. В структуре онкологических заболеваний в 2019 г. в Беларуси их доля составила 1,3%. Своевременная диагностика рака гортани (РГ) позволяет провести органосохраняющее лечение. Пятилетняя скорректированная выживаемость при РГ I–II стадии достигает 75,8%, при III – 37,8%, а при IV стадии – только 15,0% [1].

**Цель.** Провести эпидемиологический анализ заболеваемости РГ в разрезе регионов Республики Беларусь.

**Методы исследования.** Проанализированы данные за 2019 и 2022 г. отчетов организаций здравоохранения согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.04.2022 № 572.

**Результаты и их обсуждение.** Заболеваемость РГ и распределение случаев по стадиям заболевания по регионам страны в 2019 и 2022 годах представлены в таблице.

Заболеваемость злокачественными опухолями гортани характеризуется увеличением роста с 6,9 на 100 000 населения в 2019 году до 7,4 в 2022 году. В разрезе регионов на протяжении анализируемого периода заболеваемость жителей Могилевской и Гродненской областей остается выше, чем по республике, а показатели заболеваемости ниже республиканских регистрируются в Минской области и г. Минске. В 2022 году доля пациентов с впервые выявленным РГ на I–II стадии составила менее 50%.

Остается высоким уровень выявления рака гортани на поздних стадиях развития. Данная проблема является крайне актуальной и

Регион (область/ город)	2019 год			2022 год		
	Заболе- ваемость РГ на 100 тыс. на- селения	Распределение случаев по стадиям заболевания, %		Заболе- ваемость РГ на 100 тыс. на- селения	Распределение случаев по стадиям заболева- ния, %	
		I–II ста- дии	III–IV стадии		I–II ста- дии	III–IV стадии
Брестская	4,2	45,6	54,4	9,7	57,0	43,0
Витебская	6,9	51,3	48,7	6,4	61,4	38,6
Гомель- ская	8,6	55,5	44,5	6,5	48,9	51,1
Гроднен- ская	8,9	52,7	47,3	8,5	32,9	67,1
Минская	3,4	54,0	46,0	4,4	40,6	59,4
Могилев- ская	18,6	47,9	52,1	16,7	57,0	43,0
г. Минск	3,3	52,2	47,8	4,1	40,7	59,3
Респу- блика Беларусь	6,9	51,1	48,9	7,4	49,9	50,1

требует изменения системы организации и планирования деятельности организаций здравоохранения и разработки модели управления качеством медицинской помощи пациентам с заболеваниями гортани.

Сивавкова С.П., Смирнова Г.Д.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

## ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

**Актуальность.** Питание является одним из факторов, определяющих состояние физического и психического благополучия человека. В последние годы на долю несбалансированного питания, как одного из факторов риска, приходится 12,9% смертности населения, еще 12,5% – связаны с избыточным питанием. Проблема организации рационального питания особо актуальна для молодых людей