мости и, вследствие этого, являются необходимым звеном при изучении патогенеза данных состояний.

КАННАБИНОИДЫ В СТРУКТУРЕ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

*Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Сарана Ю.В., Лелевич С.В.
Гродненский государственный медицинский университет*

Согласно классификации психоактивных веществ (ПАВ) [1], к каннабиноидам естественного происхождения относят наркотические вещества, получаемые из растений рода *Cannabis* (конопли) и содержащие любой из изомеров тетрагидроканнабинола. Препараты каннабиса растительного происхождения (марихуана, гашиш, гашишное масло) являются наиболее распространенными в мире, и по оценкам международных организаций их употребляет до 224 миллионов жителей Земли [2]. В последние годы группа каннабиноидов была дополнена синтетическими аналогами тетрагидроканнабинола, которые обнаруживают в составе курительных смесей типа «Спайс». Сила галлюциногенного действия синтетических каннабиноидов намного превосходит действие марихуаны, что приводит к необратимым последствиям для здоровья [3]. В Беларуси каннабиноиды относят к особо опасным наркотическим средствам, не используемым в медицинских целях и входящим в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь.

Целью настоящего исследования явился ретроспективный анализ распространенности в Беларуси наркотиков группы каннабиноидов на основании анализа информации о потребителях наркотических и ненаркотических ПАВ, состоявших на учете в наркологических учреждениях в 2000–2014 гг.

Объектом исследования явились пациенты с синдромом зависимости от каннабиноидов (МКБ-10: F 12.2) и эпизодические потребители этих наркотиков (МКБ-10: F 12.1), состоявшие на наркологическом учете МЗ РБ в 2000–2014 гг. Анализ информации на потребителей ПАВ проводился по социально-эпидемиологическим и медицинским параметрам, которые рас-

считывались из регистрационных карт наркопотребителей, поставленных и снятых с наркологического учета. Данные из регистрационных карт вводились в компьютер и подвергались статистической обработке.

За исследуемый 15-летний период в Беларуси произошло 3-х кратное увеличение численности зарегистрированных потребителей ПАВ с 5563 человек в 2000 году до 16975 – в 2014 году. Во все годы наблюдения наиболее распространенными ПАВ в Беларуси являлись опийные наркотики, однако потребители каннабиноидов составляли вторую по численности группу наркопотребителей, попадаемых в поле зрения наркологической службы МЗ РБ [4]. По сведениям Министерства внутренних дел Республики Беларусь, основная масса марихуаны и других каннабиноидов завозится в республику преимущественно из Украины, хотя встречаются случаи выращивания растений рода *Cannabis* на территории страны. Транзитом через Литву в Беларусь попадают марихуана и гашиш голландского производства [4].

Согласно нашим наблюдениям в конце 2000 г. на наркологическом учете МЗ РБ состояло всего 175 потребителей препаратов каннабиса, что составило 3,1% от всех учтенных потребителей ПАВ. В последующие годы (2000-2006 гг.) выявление потребителей этих наркотиков увеличивалось ежегодно, достигнув 1579 человек на конец 2006 г. В дальнейшем количество учтенных потребителей каннабиноидов стабилизировалось на определенном уровне и вновь стало расти, начиная с 2010 года.

Анализ случаев употребления каннабиноидов за период 2000-2014 гг. показывает, что до 2012 года в Беларуси преобладали потребители марихуаны и других препаратов каннабиса, которые обладают очень слабым наркогенным потенциалом. Подавляющее большинство из этих лиц состояли на профилактическом учете с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов» (МКБ-10: F 12.1). Удельный вес пациентов с синдромом зависимости от каннабиноидов (МКБ-10: F 12.2) колебался от 12,5% в 2000 г., до 4,9% - в 2012 г.

Начиная с 2012 г. на наркотическом рынке Беларуси стали распространяться курительные смеси типа «спайс», обработанные структурными аналогами известных наркотиков, существенно влияющими на психическое функционирование. В составе этих миксов определялись химические соединения серий JWH и

СР, которые по силе галлюциногенного действия превосходят каннабиноиды растительного происхождения, получаемые из конопли. Если в 2010–2012 гг. количество выявленных потребителей курительных смесей составляло 4-7 человек, то на конец 2013 г. на наркологическом учете в Беларуси состояло уже 334 курильщиков «спайса».

По состоянию на 1 января 2015 г. в наркологических учреждениях республики было зарегистрировано 3054 потребителя каннабиноидов, что составляло 18% от всех наркопотребителей, состоявших на учете. Следовательно, в сравнении с 2000 г. общая численность официально зарегистрированных потребителей этих наркотиков выросла в 17 раз, что свидетельствует о возросшем поступлении этих наркотиков на территорию Беларуси.

В 2014 г. подавляющее большинство зарегистрированных потребителей каннабиноидов (81%) употребляли марихуану и другие препараты каннабиса. В остальных 19% случаях (578 человек) имело место употребление курительных смесей (миксов), содержащих синтетические каннабиноиды. Подавляющее большинство потребителей каннабиноидов (более 98%) признавались в курении марихуаны или «спайса». Только в 56 случаях употребление каннабиноидов сочеталось с приемом психостимуляторов группы амфетамина, алкоголя, опия, или других ПАВ. Это свидетельствует о том, что определенное число наркопотребителей употребляет каннабиноиды на фоне других наркотиков. В 2014 г. на диспансерном учете состояли всего 232 наркопотребителя с диагнозом «синдром зависимости от каннабиноидов» (МКБ-10: F 12.2). Это составило 7,6% от всех учтенных случаев потребления растительных и синтетических каннабиноидов.

Употребление каннабиноидов наиболее характерно для молодежи в возрасте 25 лет, доля которой среди всех потребителей каннабиноидов составила 81,4%, причем самым молодым потребителям этих наркотиков на момент постановки на учет исполнилось 9 лет.

Большая часть из зарегистрированных потребителей каннабиноидов была выявлена во время проведения оперативно-розыскных мероприятий органами внутренних дел – 1949 человек (64%). Другие обстоятельства постановки на наркологический учет распределились следующим образом: информация, поступившая из лечебных заведений не наркологического профиля

– 15,7% случаев, самостоятельное обращение за наркологической помощью – 3,5%, информация администрации учебных заведений – 0,8 % случаев.

Таким образом, за последние 15 лет в Беларуси произошли следующие изменения структуры наркопотребления, которые выражаются в следующих тенденциях:

1. Отмечено 3-х кратное общей увеличение численности учтенных потребителей различных наркотических и ненаркотических ПАВ, состоявших на учете в наркологических учреждениях республики.

2. Наибольший рост показало распространение наркотиков группы каннабиноидов. За исследуемый период 2000–2014 гг. численность официально зарегистрированных потребителей этих наркотиков выросла в 17 раз.

3. Несмотря на преобладание распространенности опийных наркотиков, доля их потребителей на наркологическом учете МЗ РБ снизилась с 80,6% в 2000 г. до 63,6% – в 2014 г.

4. Начиная с 2012 г., на наркотическом рынке Беларуси появились курительные смеси, содержащие синтетические каннабиноиды серии JWH или другие соединения. Основную проблему составляет преимущественное приобщение к курительным смесям молодых людей до 25 лет.

5. Представленные данные могут быть полезными при разработке лечебно-профилактических мероприятий, а также при формировании государственной политики в области зависимости от наркотиков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Головкин, А.И. Современные классификации психоактивных веществ / А.И. Головкин // Наркология. – 2007. – № 8. – С. 622-636.

2. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. European Drug Report 2015: Trends and Developments. Luxembourg Publication Office of the European Union, 2015. P. 86.

3. Иванов, В.В. Курительные смеси – новая проблема отечественной психиатрии / В.В. Иванов, А.А. Синевич, А.В. Сташкевич // Психиатрия. Психотерапия и клиническая психология. – 2013. – Т. 12, № 2. – С. 89-95.

4. Региональные особенности наркологической ситуации в Республике Беларусь. Беларусь / В.В. Лелевич В.В., [и др.]. - Гродно: ГрГМУ, 2012. – 176 с.