

АФФЕКТИВНЫЕ ДИСПОЗИЦИИ В СВЯЗИ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ПОЛОМ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Алексеев О. В., Жуклевич Д. И., Силиванович В. В.

УО "Гродненский государственный медицинский университет"

Научный руководитель: Филипович В. И.

Актуальность. Развитие сообществ предлагает возможности и выдвигает различные требования к формированию профессиональных компетенций личности. Способность ответить на профессиональный запрос общества ожидаемо приведет к чувству успеха и повышению оптимизма у личности. Актуально определить влияние социально обусловленного психологического пола на общее чувство оптимизма у активно профессионализирующейся личности.

Цель. Изучение аффективных диспозиций в связи с различным психологическим полом у студентов медицинского университета.

Методы исследования. Методики: «Маскулинность-фемининность» Сандры Бем (1974) [2]; «Тест диспозиционного оптимизма», версия Гордеевой – Сычёва – Осина, 2010 [1]. Выборка включила 51 студента медико-психологического и лечебного факультетов ГрГМУ от 17 до 30 лет, из них 76,47% девушки.

Результаты и их обсуждение. У студентов медицинского университета, преимущественно девушек, преобладает андрогинный психологический пол (43 человека, 86,3%), маскулинный и феминный психологический пол составляет соответственно 4% (2 человека) и 10% (5 человек).

Студенты в основном имеют среднюю выраженность оптимизма / пессимизма (32 человека, 62,8%), у 10 человек (19,6%) преобладает пессимизм, у 9 человек (17,6%) преобладает оптимизм.

У маскулинного пола наблюдается средняя выраженность оптимизма / пессимизма (100%).

У феминного пола преобладает средняя выраженность оптимизма / пессимизма (60%), что касается оптимизма, то в данной группе он не выявлен, а пессимизм составляет 40%. При этом в феминной группе для шкалы «оптимизм/пессимизм» $x_{cp}=5,6$, $\sigma=5,18$, для шкалы «оптимизм» $x_{cp}=9,4$, $\sigma=4,6$, для шкалы «пессимизм» $x_{cp}=10,4$, $\sigma=5,18$, для общего балла аффективных диспозиций $x_{cp}=19,8$, $\sigma=9,58$.

Самая многочисленная группа андрогинного психологического пола характеризуется средней выраженностью шкалы «оптимизма / пессимизма», преобладающего у 61,4% испытуемых, выраженный оптимизм выявлен у 20,4% человек, а пессимизм – у 18,2% респондентов. При этом в андрогинной группе

для шкалы «оптимизм/пессимизм» $x_{cp}=3,65$, $\sigma=3,35$, для шкалы «пессимизм» $x_{cp}=12,34$, $\sigma=3,34$, для шкалы «оптимизм» $x_{cp}=12,14$, $\sigma=3,02$, для общего балла аффективных диспозиций $x_{cp}=24,48$, $\sigma=5,75$.

Для сравнения значимости различий выраженности аффективных диспозиций между выявленными 3 группами психологического пола применялся однофакторный дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса $H(N=51)=5,818172$, $p=0,055$. Группы различаются на уровне тенденции. При этом, наибольшие различия выявлены между группами андрогинного и маскулинного психологического пола и группами андрогинного и феминного психологического пола. Феминный пол наиболее «пессимистичен».

Андрогинный психологический пол вариативен при ответе на социальные ожидания. При феминной идентификации личность, вероятно, прилагает большие усилия, чтобы соответствовать высоким социальным ожиданиям, репрезентированным в идеализированном женском образе.

Выводы. Студенты медицинского университета, преимущественно девушки, хорошо приспособлены к различным профессиональным задачам, так как преобладающий у них андрогинный психологический пол более свободен от стереотипов о типично женских или типично мужских активностях. Преобладающий средний уровень оптимизма свидетельствует об адаптивности, позволяет трезво мыслить в стрессовых ситуациях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гордеева, Т.О. Разработка русскоязычной версии теста диспозиционного оптимизма / Т.О. Гордеева, О.А. Сычёв, Е.Н. Осин // Психологическая диагностика. – 2010. – № 2. – С. 36–64.
2. Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2003 – 544 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ЛИНЗ STELLEST В КОНТРОЛЕ МИОПИИ У ДЕТЕЙ

Алексейчикова А. Д.¹, Залесская О. К.²

УО «Гродненский государственный медицинский университет»¹,
МЦ "Вимпа"²

Научный руководитель: Романчук В. В.

Актуальность. По статистике близорукостью страдает каждый третий человек на земле. Ежегодно в Республике Беларусь миопия диагностируется более чем у 5000 детей школьного возраста. Оптические методы контроля