

ОСОБЕННОСТИ МАСТИТОВ У ДЕТЕЙ

Длубок Ю. С.

УО "Гродненский государственный медицинский университет"

Научный руководитель: Гнедова А. В.

Актуальность. Такая патология как мастит у взрослых достаточно хорошо изучена, однако об этом же заболевании у детей известно меньше. Работы, посвященные маститам у детей, немногочисленны [1]. Этиология до конца не выяснена, но так как маститы наблюдались при отсутствии лактации, они получили название нелактационных [2].

Цель. Изучить эпидемиологию, этиологию, клинику, диагностику и лечение маститов у детей.

Методы исследования. Проанализированы медицинские карты 38 пациентов, находившихся на лечении по поводу мастита в 8 хирургическом отделении УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» за период с января 2019 по декабрь 2023 г.

Результаты и их обсуждение. Среди общего количества пациентов было 37 девочек (97,4 %), 1 (2,6 %) – мальчик. Преимущественно патология встречается в возрасте 12 лет. Самому младшему пациенту было 19 дней, самому старшему – 17 лет.

23 пациента (61 %) проживает в г. Гродно, 15 (39 %) – в Гродненской области. В стационар 16 пациентов (42 %) обратилось самостоятельно, 10 (26 %) – направлено детской поликлиникой, остальные (32 %) – другими медицинскими учреждениями (медицинский центр ЛОДЭ, станция скорой и неотложной помощи). Весной за медицинской помощью обратилось 11 пациентов (29 %), летом – 13 (34 %), осенью – 8 (21 %), зимой – 6 (16 %).

При поступлении в стационар у 23 пациентов (60,5 %) был диагностирован правосторонний мастит (в стадии инфильтрации у 6, абсцедирования – 14), 15 (39,5 %) – левосторонний (в стадии инфильтрации у 5, в стадии абсцедирования – 10). У всех пациентов при поступлении отмечался выраженный болевой синдром, у 16 – повышение температуры тела до субфебрильных цифр. При пальпации у всех пациентов определялось болезненное образование в области молочной железы.

В качестве инструментального метода диагностики использовалось УЗИ молочных желез. 14 пациентам выполнено в первые несколько суток от поступления, 15 – дополнительно с целью оценки динамики заболевания. Дополнительно 4 пациентам проводилось УЗИ ОМТ. Консультация гинеколога была у 7 пациентов.

Уровень гемоглобина у 25 пациентов соответствовал норме, у 7 – повышен, у 6 – снижен. Ускорение СОЭ наблюдалось у 13 пациентов.

Оперативное лечение проведено 29 пациентам (78,9 %), при этом 27 выполнено вскрытие мастита, 3 – пункция образования. 25 пациентам операции проводились в первые сутки после поступления. В 8 случаях (21,1 %) проявления мастита, диагностированного при поступлении в стационар, были купированы посредством консервативной терапии. 1 пациент отказался от операции.

Во время оперативных вмешательств у пациентов был взят посев раневого отделяемого. В 6 случаях был высеян *Staphylococcus aureus*, в 4 – *Staphylococcus epidermidis*, в 1 – *Enterococcus*, *Aeromonas hydrophila*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, в 9 – микроорганизмы не выделены.

Количество койко-дней, проведенных пациентами в стационаре, определялось тяжестью их состояния и видом лечения. Пребывание пациентов в стационаре с оперативным вмешательством в среднем составило 8 дней, с консервативным лечением – 6,2 дня.

Выводы.

1. Средний возраст пациентов с маститом составил 11,6 лет.
2. Наиболее высокий уровень регистрации маститов отмечается в весенне-летний период (63,8 %).
3. При поступлении чаще был диагностирован мастит в стадии абсцедирования (63,2 %).
4. Оперативное лечение потребовалось в 29 случаях (78,9 %).

ЛИТЕРАТУРА

1. Абаев, Ю. К. Маститы в детском возрасте / Ю. К. Абаев, И. И. Найчук // Педиатрия. – 2004. – №1. – С. 53 – 57.
2. Травина, М. Л. Особенности воспалительных процессов молочной железы в подростковом возрасте, тактика ведения и лечения больных / М. Л. Травина, А. Г. Попов, С. А. Попов, Е. В. Куликова // Детская хирургия. – 2017. – 21(3). – С. 150 – 153.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ДЕРМАТОЛОГИЯ»

Дмитрук Д. И.

УО "Гродненский государственный медицинский университет"

Научный руководитель: Нечай М. А.

Актуальность исследования определяется следующими факторами:

- 1) интересом современной лингвистики к изучению отдельных терминологических систем с целью выявления общих закономерностей их развития;
- 2) недостаточностью разработанности целого ряда теоретических и практических вопросов общего и частного терминоведения;
- 3) не изученностью