

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ У СИБЛИНГОВ

Захаревич П. Д.

УО "Гродненский государственный медицинский университет"

Научный руководитель: Климович Е. А.

Актуальность. Исследование психики и её защитных механизмов у сиблингов играет важную роль в современной психологии. Отношения между братьями или сестрами имеют гораздо более насыщенную эмоциональную окраску, чем с остальными детьми [1]. Как эмоциональные взаимоотношения, так и поведенческие реакции часто бывают связаны с разницей в возрасте между детьми. Меньшая разница в возрасте может говорить о большем сходстве интересов, но, с другой стороны, она сопровождается более высокой частотой конфликтов между сиблингами [2]. Вместе с разницей в возрасте детей меняется и родительское к ним отношение [2]. Таким образом, актуальность данной темы повсеместно сохраняется и в настоящее время.

Цель. Исследовать защитные механизмы психики у сиблингов.

Методы исследования. Проводилось исследование 63 респондентов 15 – 17 лет (6,3% единственные в семье, 60,3% имеют одного сиблинга, 33,3% – двоих и более). У 15,3% исследуемых разница в возрасте в 1-2 года, у 16,9% – в 3-4 года, у 23,7% – в 5-6 лет, у 27,1% – в 7 и более лет.

Использован опросник "Индекс жизненного стиля" (Р. Плутчик, Х. Келлерман, Х. Конте).

Результаты и их обсуждение. Респонденты, имеющие двух и более сиблингов, чаще обращаются к замещению и реактивному образованию (по 61,9%), регрессии, и компенсации (по 57,2%). Реже, но интенсивно используются отрицание, подавление, проекция и интеллектуализация (по 47,6%).

Участники, имеющие одного сиблинга, активнее применяют компенсацию (52,6%), отрицание (50%). Подавление, регрессия, интеллектуализация и реактивное образование применяются с одинаковой частотой в 42,1%. Реже, но у интенсивно, используются проекция (31,6%) и замещение (23,7%).

У респондентов, не имеющих сиблингов, чаще используется отрицание, реже – проекция, замещение, интеллектуализация.

У детей, с разницей в возрасте с сиблингами в 1-2 года, преобладают отрицание, регрессия и интеллектуализация (55,6%), реже – подавление и компенсация (33,3%) и проекция, замещение и реактивное образование (22,2%).

С разницей в 3-4 года: ведущий механизм – компенсация (80%), реже – интеллектуализация (60%), регрессия и замещение (по 50%), подавление и реактивное образование (по 40%). Почти не используются отрицание и проекция (по 20%).

С разницей в 5-6 лет: отрицание (64,3%), подавление (57,1%), реактивное образование (50%), компенсация (42,9%), регрессия и проекция (по 35,7%), интеллектуализация (28,6%), замещение (21,4%).

С разницей в 7 и более лет: компенсация (81,3%), отрицание и реактивное образование (68,8%), подавление (56,3%), регрессия (50%), интеллектуализация (43,8%), проекция (37,5%), замещение (31,3%).

Выводы. Подростки, с одним или без сиблингов, активнее применяют отрицание, но нечсто – замещение и проекцию. У детей с двумя и более сиблингами замещение – ведущая защита, а отрицание с самой низкой частоту применения.

Рассматривая фактор разницы в возрасте между сиблингами, большинство чаще применяет отрицание, кроме сиблингов с разницей в 3-4 года, где оно используется реже остальных защит. При разнице от 5 лет и старше реактивное образование применяется чаще, а при разнице в 1-2 года эта защита самая редкая. Проекция и замещение у исследуемых подростков почти не применяются

ЛИТЕРАТУРА

1. Никольская, И.М. Психологическая защита у детей [Электронный ресурс]/ И.М. Никольская, Р.М. Грановская. – СПб.: Речь, 2000. – 507 с. – Режим доступа: https://www.koob.ru/granovskaya_r/psih_zashita_u_detey. – Дата доступа: 17.03.2024.

2. Булыгина, М.В. Сиблинговые отношения и их роль в жизни человека [Электронный ресурс] / М.В. Булыгина // Современная зарубежная психология. – 2021. – Том 10. – № 4. – С.147–156– Режим доступа: <https://doi.org/10.17759/jmfp.2>. – Дата доступа: 17.03.2024.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ И ЕЁ СВЯЗЬ С СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ И КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ

Захаревич П. Д.

УО "Гродненский государственный медицинский университет"

Научный руководитель: Бозырь С. Р.

Актуальность. Исследование комплайенса пациентов с шизофренией имеет теоретическое и практическое значение для современной психиатрии. Основные факторы, определяющие предрасположенность пациента к лечению, связаны с особенностями медикации, личностью пациента и его связью с