

196 пациентов (12%); (2022г –167 (11%)). Не направлены для реабилитации 106 пациентов (6,5%) трудоспособного возраста, из них: 4,5% с ФК 0-I; с противопоказаниями – 0,9%; в связи с наличием судорожного синдрома – 0,3%; в связи с переводом в другой стационар – 0,6% пациентов; 0,18% пациентов отказались. Летальность в различных возрастных группах в 2023 году: старше 80 лет – (24,1%), 71-60 лет – 45 (9,0%), 61-70 лет – 26 (5,5%), 51-60 лет – 4 (1,6%). Досуточная летальность составила 4,6 % (2022 – 10,7%). Летальность в трудоспособном возрасте составила 1,8% (2022 – 4,6%).

Выводы. В нозологической структуре пролеченных пациентов большую часть занимают пациенты с инфарктом мозга. Треть пациентов поступают в стационар в первые шесть часов. На реабилитацию направлены около 10% пролеченных пациентов. Самая высокая летальность в группе пациентов 80 лет и старше. Досуточная летальность снизилась на 6,1% в сравнении с 2022 годом. Летальность в трудоспособном возрасте снизилась на 2,8%. Высокая частота острых мозговых нарушений требует высоких стандартов в оказании лечебно-диагностической помощи нашим пациентам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2021-2025годы [Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров Респ. Беларусь 19 января 2021 г. № 28 – Режим доступа: <http://www.pravo.by>. – Дата доступа: 28.01.2025.

САРКОМЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бычковский П. Н.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: ст. препод. Патюпо Е. О.

Актуальность. Саркомы мягких тканей (СМТ) представляют собой гетерогенную группу редких опухолей, происходящих из мезенхимальной ткани (мышц, жировой ткани, волокнистой соединительной ткани, фасций, сухожилий, синовиальных оболочек, сосудов и нервов) [1]. В структуре онкологической заболеваемости составляют примерно 1% от всех злокачественных новообразований. Однако, каждый случай саркомы мягких тканей (СМТ) требует внимания из-за их агрессивного течения, сложности в диагностике и лечении.

Цель. Проанализировать эпидемиологическую картину заболеваемости саркомами мягких тканей в Гродненской области за период с 2020 по 2024 год.

Методы исследования. Проведен анализ 22 амбулаторных карт пациентов Гродненской области с гистологически подтвержденным диагнозом «саркома мягких тканей» за период с 2020 по 2024 год.

Результаты и их обсуждение. В половой структуре СМТ чаще встречаются у женщин – 15 случаев (68,2%). Заболеваемость выше у пациентов, проживающих в сельской местности – 16 случаев (72,7%). Чаще всего заболевание обнаруживали у пациентов пожилого и старческого возраста. Пациенты старше 71 года – 11 случаев (54,8%) составили половину из всех пациентов. До 20 лет – 1 случай (4,5%), 21 – 50 лет – 3 случая (13,5%), 51 – 70 лет – 6 случаев (27,2%). СМТ имеют высокую склонность к системному распространению, чаще всего гематогенным путем. Основным органом-мишенью для метастазирования является легкое. При первичном обращении в 3 случаях (13,6%) были выявлены метастазы в легких. В процессе наблюдения и лечения – 7 случаев (31,8%). Чаще всего СМТ выявлялась III-IV стадиях – в 19 случаев (86,4%). Самой частой локализацией сарком мягких тканей является область нижних конечностей – 23 случаев (62,1%). Остальная выборка распределилась между мягкими тканями лица, шеи, спины, верхних конечностей. Гистологический тип чаще всего встречаемый – недифференцированные саркомы – 16 случаев (47,0%), веретенноклеточная саркома – 4 (12,9%), недифференцированная плеоморфная саркома – 2 (6,45%), гигантоклеточная саркома – 2 (6,45%), эпителиоидная саркома – 1 (3%), ангиосаркома 1 (3%), полиморфноклеточная саркома – 1(3%), круглоклеточная саркома 1 (3%), лейомиосаркома 1(3%), десмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль – 1(3%), рабдомиосаркома – 1 (3%), дерматофибросаркома – 1 (3%). Основным подходом к лечению является комплексное лечение – использование хирургического, радиационной и химиотерапии. В большинстве случаев изначально выполнялась резекция первичной опухоли, при распространении опухоли на лимфатические узлы – лимфоаденэктомия, при массивном дефекте – реконструктивные операции. В качестве адьювантного лечения проводилась химиотерапия и лучевая терапия (брахитерапия, дистанционная лучевая терапия). Объем планированного лечения также зависел от соматического состояния пациентов и сопутствующей патологии. Чаще всего пациенты страдали от ишемической болезни сердца – 8 случаев (36%), артериальной гипертензии – 5 случаев (22,7%), сахарного диабета 2 типа – 2 случая (9%), эрозивного гастрита – 9 случаев (41%).

Выводы. СМТ является редкой патологией в структуре онкозаболеваемости в Республике Беларусь. Это заболевание чаще встречается у женщин, сельских жителей, людей пожилого и старческого возраста. Опухоль отличается агрессивностью и высокой пролиферативной активностью, на что указывает преобладание распространенных стадий СМТ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Прохоров, А.В. Онкология: учебное пособие : в 2 частях / А. В. Прохоров, Ю. Е. Демидчик, Т. А. Корень, Н. И. Крутилина. – Минск : Новое знание, – 2019 – Часть 2 : Частная онкология – 2019. – 480 с.

ВЫРАЖЕННОСТЬ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Вадорацкая-Ромук В. К.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Воронко Е. В.

Актуальность. Студенты-медики, как будущие врачи, в процессе обучения получают не только профессиональные знания, умения и навыки, но и развивают личностные качества. Их личностные характеристики могут оказывать значительное влияние на качество оказываемой медицинской помощи и удовлетворенность пациентов. Для студентов-медиков важно изучить такие черты личности как макиавеллизм, нарциссизм и психопатия.

Цель. Изучить выраженность черт личности у студентов-медиков.

Методы исследования. Теоретико-библиографический анализ; методы: психодиагностический метод (Короткий опросник Темной триады). База и выборка исследования: 25 студентов 2 курса и 25 студентов 4 курса медико-психологического факультета ГрГМУ.

Результаты и их обсуждение. Исходя из анализа результатов диагностики можно констатировать ряд особенностей. Большинство респондентов (58%) – это студенты со средней степенью критичности мышления, эмоциональной устойчивости, прагматизме и способности реалистично оценивать себя и других. 34% респондентов можно охарактеризовать как людей, которые просчитывают последствия своего поведения, ориентированы на дальние цели и отсроченные вознаграждения, склонны к поиску выгоды. Проявления склонности к манипулированию и использованию других в собственных целях могут носить адаптивный характер и способствовать более быстрому и эффективному решению поставленных задач, а также снижать уровень стресса. Большинство респондентов (74%) со средней степенью выраженности мнения о собственном вкладе в общество или группу. Для данной степени выраженности характерно умеренное проявление нарциссических черт. Студенты могут быть уверенными в себе, открытыми для общения, но при этом сталкиваться с трудностями в понимании проблем и взглядов других людей. Такие результаты могут