

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Прокопенко В. Ю., Бекиш Н. В.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Довнар А. И.

Актуальность. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) характеризуется высокой заболеваемостью и смертностью, при этом на нее приходится каждый третий летальный исход травмы [1]. Общая летальность при ЧМТ составляет 5-10%, а при тяжелых формах ЧМТ при наличии внутричерепных гематом или очагов ушибов данный показатель может достигать 41-85% [2].

Цель. Провести анализ результатов лечения и исходов черепно-мозговой травмы в зависимости от ее тяжести.

Методы исследования. Выполнено ретроспективное изучение 230 медицинских карт стационарных пациентов, находившихся на лечении в УЗ «ГКБСМП г. Гродно» в 2024 году. Проводилась оценка тяжести черепно-мозговой травмы и ее влияние на исход лечения. Формирование исследовательской базы и статистические расчеты выполнены при применении пакета прикладной компьютерной программы Microsoft Office Excel 2019.

Результаты и их обсуждение. Всего за 2024 год было пролечено 230 пациентов с черепно-мозговой травмой. Открытая ЧМТ была в 54 случаях (23,5%), закрытая – 176 (76,5%). По степени тяжести отмечалось следующее распределение: легкой степени тяжести – 47 (20,4%) , средней тяжести – 133 (57,8%), тяжелой – 50 (21,7%). При оценке сознания пациентов по шкале ком Глазго получены следующие результаты: ясное сознание – 111 (48,3%), умеренное оглушение – 56 (24,3%) , глубокое оглушение – 30 (13,0%), сопор – 14 (6,1%), умеренная кома – 3 (1,3%), глубокая кома – 11 (4,8%), запредельная кома – 5 (2,2%). Всего с улучшением состояния выписано было 187 пациентов, переведено на реабилитацию в другие стационары – 17 пациентов, умерло – 26. Из пациентов выписанных на улучшение 44 (23,5%) поступало с легкой степенью тяжести, 124 (66,3%) – со средней, 19 (10,2%) – с тяжелой. Всего 2 пациента с легкой степенью тяжести было переведено на реабилитацию в другие стационары, а также 3 пациента со средней и 12 с тяжело. Больше всего умерло пациентов с тяжелой степенью тяжести (20 человек), со средней степенью тяжести – 6.

Выводы. В 2024 году в учреждение было госпитализировано 230 пациентов с черепно-мозговыми травмами, из которых 76,5% составили закрытые травмы. Наибольшее количество случаев пришло на среднюю степень тяжести (57,8%), при этом 48,3% пациентов находились в ясном сознании. Положительные исходы лечения наблюдались у 187 пациентов, однако 26 (11,3%) скончались, из которых

73,1% имели тяжелую степень травмы. Из 17 переведенных на реабилитацию пациентов большинство (12) также относились к тяжелым случаям, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к диагностике, лечению и реабилитации для снижения смертности и улучшения исходов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Abdelmalik, P. A. Management of moderate and severe traumatic brain injury / P. A. Abdelmalik, N. Draghic, G. S. F. Ling // Transfusion. – 2019. – Vol. 59, № S2. – P. 1529–1538.
2. The Relationship Between Vasoactive-Inotropic Score and Mortality in Adult Patients with Traumatic Brain Injury / I. Kara, M. Sargin, Y. S. Bayraktar [et al.] // Turkish neurosurgery. – 2019. – Vol. 29, № 2. – P. 254-261.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ АКТУАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ НА ОСНОВЕ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГрГМУ

Протас А. Н.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Стрелков О. Г.

Актуальность. Студенты медицинских университетов сталкиваются с интенсивной учебной нагрузкой и высоким уровнем стресса, что стимулирует студентов активизировать психические процессы совладания с актуальной конфликтной ситуацией. Актуальный конфликт – это психологическое состояние дискомфорта, возникающее на базе внешних воздействий [1]. Понимание баланса в позитивной психотерапии позволяет понять механизмы совладания с конфликтом, так выделено 4 способа: посредством ощущения (тело), посредством сознания (деятельность), посредством традиций (контакты), посредством интуиции (фантазии). Что позволит, посредством активации неактивных стратегий, увеличить адаптационные возможности студентов [2].

Цель. Изучить реакции на актуальный конфликт у студентов УО Гродненского Государственного медицинского университета (УО ГрГМУ).

Методы исследования. Было опрошено 40 студентов 4 курса УО ГрГМУ (мужчины и женщины), в возрасте 20-22 года. Использовался Висбаденский опросник к методу позитивной психотерапии и семейной терапии (WIPPF).

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что посредством сфер «Деятельность» (37,5% у женщин и 39,29% у мужчин) и «Тело» (25% у женщин и