

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ СИФИЛИСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Барцевич И.Г.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

За последние годы в Республике Беларусь, благодаря усилиям со стороны различных медицинских служб и государства в целом, удалось снизить уровень заболеваемости инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путем, в том числе и сифилиса.

Изучение состояния и динамики заболеваемости сифилисом населения Республики Беларусь свидетельствует, что два последние десятилетия характеризуются подъемом и спадом уровня исследуемой патологии. Пик сифилитической инфекции приходится на 1996 год (210,9 случая на 100000 населения) с последующим ежегодным снижением ее уровня до 32,7‰ в 2005 году.

Рассматривая наметившуюся тенденцию снижения заболеваемости сифилисом в республике, следует обратить внимание на отдельные регионы, где уровень и темпы снижения инфекции порою отличаются более чем в два раза (Гродненская область – 20,8, Витебская область – 54,6 случая на 100000 населения, 2005г.).

По этой причине регионы страны по интенсивности процесса (на 100000 жителей) можно условно разделить на три группы:

- низкий уровень заболеваемости – до 21 случая (Брестская, Гродненская области, г. Минск);
- средний уровень заболеваемости – от 21 до 41 случая (Минская, Могилевская, Гомельская области);
- высокий уровень заболеваемости – свыше 41 случая (Витебская область).

Несмотря на высокие темпы снижения сифилитической инфекции (в среднем 25% ежегодно), достигнуть уровня заболеваемости, например, Франции (0,71‰), можно только через 10 лет.

В связи с этим представляется важным исследование уровня заболеваемости сифилисом в зависимости от места жительства, возраста и пола.

Изучение сифилиса в разрезе пола показало, что среди мужчин показатель заболеваемости в 1,1 раза выше относительно женщин. Однако статистически это различие не подтверждается ($t=0,7$; $P>0,05$). В динамике прослеживается более интенсивное снижение уровня сифилитической инфекции у женщин, вследствие чего увеличивается разница показателей в половом аспекте в 1,2 раза в сторону мужчин.

Возрастной группой риска, где регистрируется наиболее часто сифилис, у мужчин является интервал в 20-29 лет, а у женщин – 18-19 лет. Причем, в динамике темпы снижения заболеваемости у мужчин во всех возрастных группах примерно одинаковы, а у женщин они выше в раннем молодом возрасте (до 20 лет). Несмотря на это, уровень заболеваемости лиц женского пола в возрасте до 20 лет практически в 2,0 раза выше по сравнению с мужчинами этой возрастной группы.

Обращают на себя внимание тенденции распространенности сифилиса в зависимости от места жительства.