

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Басай Е.А.

*УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М.*

Новообразования занимают особое место в современной медицине в связи с неуклонным ростом заболеваемости и крайней необходимостью ранней диагностики. Онкологические заболевания - одна из основных причин смертности и инвалидности. Поэтому изучение причин и закономерностей развития онкологических заболеваний среди населения является одной из важнейших задач в современном здравоохранении. В связи с чем нами была поставлена цель: изучить уровень и структуру госпитализированной заболеваемости взрослого населения. Статистически было обработано 636 карт выбывшего из стационара Гродненского областного онкологического диспансера за 2006 год.

Первое место в структуре госпитализации занимает рак прямой кишки (23,1%), второе место – рак желудка (23%), третье место – рак ободочной (21,4%).

Большую часть госпитализированных составили мужчины (51,1%). Но среди госпитализированных с раком ободочной кишки, пигментным невусом, полипами преобладали женщины, соответственно, их удельный вес составил 55,1%; 76,6%; 65,8%.

Наиболее часто госпитализировались лица в возрастной группе старше 60 лет (51,7%). А вот реже всего в группе 18-30 лет (9,6%). Но среди больных, госпитализированных с пигментным невусом, три из четырех (73,3%) имели возраст 18-30 лет.

Средний срок госпитализации составил 13 дней. Наименьшее количество дней пребывали в стационаре больные с пигментным невусом – 6 дней. Почти каждый третий больной госпитализировался в осенний период. Большая часть (69,7%) пациентов проживала в городской местности. Только 9,7% больных госпитализировалось в стационар повторно. У каждого четвертого (78,4%) проводилось оперативное вмешательство. 15,4% больных госпитализировалось в стационар с сопутствующей патологией. Причем, у 61% из них зарегистрирована ишемическая болезнь сердца. При выписке из стационара лишь у 4% пациентов функциональный класс ухудшился.

Таким образом, полученные нами результаты необходимо учитывать при планировании организации онкологической помощи взрослому населению.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РОЛЬ КУЛЬТУРЫ

Батырова О.А.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., профессор Лукьянова Л.И.*

Всем хорошо известно, что человек фактически начался с появлением у его предков первых элементов культуры в виде своеобразных психических образований, регулирующих поведение и межличностное общение. Из этого можно сделать вывод,