МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Министра
_____ Д.Л.Пиневич
16 декабря 2016 г.
Регистрационный № 107-1116

МЕТОД АНТИФИБРОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ–РАЗРАБОТЧИК:
Учреждение образования
«Гродненский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ:
д.м.н., профессор В. М. Цыркунов, С. А. Черняк

Гродно, 2016

Репозиторий ГрГМУ

В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) изложен метод антифиброзной терапии при хроническом поражении печени (ХПП), который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на повышение эффективности лечения пациентов с ХПП.

Метод, изложенный в настоящей инструкции, предназначен для врачей-инфекционистов, врачей-терапевтов и иных врачебных специалистов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ХПП.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, РЕАКТИВОВ И Т.Д.

Лекарственное средство – бактериальный липополисахарид (pyrogenalum), раствор для внутримышечного введения в ампулах 50 мкг по 1 мл в коробке картонной 10 ампул, нож ампульный, шприц инъекционный одноразовый 2 мл.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

К74.0, В18.0 Хроническое поражение печени с признаками фиброза 1, 2, 3 стадии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гиперчувствительность к бактериальному липополисахариду; сердечная недостаточность; печеночная и почечная недостаточность; аутоиммунные заболевания (в анамнезе); беременность; лактация.

Репозиторий ГрГМУ

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

1. Бактериальный липополисахарид назначается пациентам с ХПП в сочетании с диагностированным фиброзом печени, независимо от другой терапии.

2. Бактериальный липополисахарид (pyrogenalum) вводится в утренние часы (не позже 10.00 часов), внутримышечно, курсом 10 инъекций, через день, начиная с 5 мкг (разовая доза), с увеличением последующей разовой дозы на 5 мкг до курсовой дозы 30 мкг; повторные курсы терапии проводятся через 6 и 12 месяцев, без изменения схемы.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

После введения бактериального липополисахарида возможно повышение температуры тела до субфебрильных цифр, слабый озноб и легкое недомогание. Такое состояние может длиться от 3 до 8 ч. В этом случае доза, вызвавшая подобную реакцию, в последующие дни остается прежней до прекращения реакции на ее введение (обычно 1–2 инъекции), после чего дозу последовательно повышают на 5 мкг.

Репозиторий ГрГМУ

_____
название
_____
учреждения
_____
здравоохранения

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

_____ _____
И.О.Фамилия
_____201___
МП

А К Т

учета практического использования инструкции по применению

1. Инструкция по применению: «Метод антифиброзной терапии при хроническом поражении печени».

2. Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь 16.12.2016 №. 107–1116

3. Кем предложена разработка: сотрудниками кафедры инфекционных болезней учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет»: профессором Цыркуновым В.М., ассистентом Черняком С.А.

4. Материалы инструкции использованы для _____
_____
_____
_____

5. Где внедрено: _____
_____
_____
_____
подразделение и название учреждения здравоохранения

6. Результаты применения метода за период с _____ **по**_____
общее кол-во наблюдений «____»
положительные «_____»
отрицательные «_____»

7. Эффективность внедрения (восстановление трудоспособности, снижение заболеваемости, рациональное использование коечного фонда, врачебных кадров и медицинской техники)_____
_____

8. Замечания, предложения: _____
_____

_____201__ Ответственные за внедрение
_____
Должность подпись И.О.Фамилия

Примечание: акт о внедрении направлять по адресу:
кафедра инфекционных болезней
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
ул. Горького, 80, 230009, г. Гродно

Репозиторий ГрГМУ