

# УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ СИФИЛИСА

**Савицкий В.В.**

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра дерматовенерологии с курсом эндокринологии

Научный руководитель - к.м.н., Д.Ф.Хворик

При анализе динамики сифилиса в Республике Беларусь установлено, что на протяжении последних 10 лет заболеваемость быстро снижалась. Так, в 2005 г. по сравнению с 1996 г. заболеваемость сифилисом снизилась на 20,6% и составила 32,7 случаев на 100 тыс. населения. Однако показатель заболеваемости сифилисом молодежи 15-19 лет в 2005 г. превышал общий показатель заболеваемости всего населения примерно вдвое. А заболеваемость девушек подросткового возраста сифилисом и другими инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), была в 2-5 раз выше, чем у юношей. Все это может свидетельствовать о наличии препятствий у подростков к получению медицинских услуг и затруднений в получении информации о профилактике ИППП [1].

С целью получения сведений, касающихся вопросов осведомленности молодежи по проблеме сифилиса (этиология, клинические проявления, исходы и профилактика), нами проведено анкетирование 165 студентов-спортсменов, обучающихся на факультете физической культуры УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы».

На вопрос о механизмах и путях заражения большинство респондентов указали, что данное заболевание чаще всего передается при половом контакте с больным человеком. Отмечен рост уверенности в этом, во время обучения от первого к 4-5 курсам. Вторым по значимости среди путей передачи инфекций респонденты отметили возможность заражения при оральном сексе (с 24,7% до 47,4%). На

третьем месте респонденты указали возможность заражения при бытовом контакте с больным (соответственно в 36,0% и 53,9% случаев).

Наиболее частым симптомами сифилиса респонденты-первокурсники назвали выделение гноя из мочеиспускательного канала, половых органов (31,5%), рези, боли, жжение при мочеиспускании (31,5%), покраснение и отек губок мочеиспускательного канала (25,8%), припухлость, отечность и боли в яичках (24,0%), боли в промежности, внизу живота, в пояснице (21,0%), сыпь бледно-розового и красного цвета на различных участках тела (14,6%). На увеличение лимфатических узлов указали 10,1%, а на твердый шанкр только 1 человек. Среди респондентов старших курсов главными симптомами заболевания чаще назывались: твердый шанкр (37,2%), увеличение лимфатических узлов (45,1%), сыпь бледно-розового и красного цвета на различных участках тела (50,0%), выпадение волос, бровей, ресниц (18,3%), что указывает на существенный прирост уровня осведомленности студентов 4-5 курсов по сравнению с началом обучения в вузе. Однако среди характерных симптомов сифилиса анкетированные нередко отмечали признаки, не относящиеся к клинике данного заболевания, например, выделение гноя из мочеиспускательного канала, половых органов (соответственно среди первокурсников 31,0% и среди старшекурсников – 53,2%), рези, боли, жжение при мочеиспускании (31,3% и 54,0%), покраснение и отек губок мочеиспускательного канала (26,0% и 50,0%).

На наш взгляд, важным являлся вопрос о возможности излечения пациентов от сифилиса. Число респондентов, уверенных в достижении полного выздоровления после терапии, возрастает от 36,0% до 48,7%. На возможность излечения «свежего» сифилиса указали 42,7% анкетированных на первом курсе и 37,2% старшекурсников. На опасность для окружающих людей в домашней обстановке больных сифилисом указали менее половины респондентов первого курса (44,9%) и более

половины (59,1%) старшекурсников.

Литература:

1. Навроцкий А.Л. О состоянии заболеваемости и организации дерматовенерологической помощи населению Республики Беларусь // Материалы V съезда дерматовенерологов Республики Беларусь.-2006.- С.14-18.

## **ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГОНОРЕИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ**

**Савицкий В.В., Савицкий С.В.**

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра дерматовенерологии с курсом эндокринологии

Научный руководитель - к.м.н., Д.Ф.Хворик

По официальным статистическим данным заболеваемость гонореей в Республике Беларусь в 2004 г. по сравнению с 2003 г. возросла на 1,5% и составила 61,2 на 100 тыс. населения. Кроме того, более половины всех случаев инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), приходится на молодой возраст (15-24 года). Такая ситуация может быть обусловлена распространением добрачных сексуальных отношений, высокой миграцией населения, снижением роли института семьи в воспитании детей, недостаточной информированностью населения о возможностях профилактики и получения квалифицированной помощи в области сексуального здоровья.

Для оценки уровня знаний в вопросах этиологии, клиники и профилактики гонореи, полученных в педагогическом вузе, нами обследована группа студентов, занимающихся на факультете физической культуры УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы». Численность выборки первокурсников составила 89 человек (52 - юноши и 37 - девушки), старшекурсников – 76 человек (33 - юноши и 43 - девушки).

При ответе на вопрос о времени проявления первичных признаков