Изменения наследственного материала приводят к повышению вариабельности артерий верхней конечности, что свидетельствует о значении наследственных факторов в происхождении индивидуальной анатомической изменчивости артерий кисти. Результаты нашего исследования могут быть применены не только в теоретической части, восполнив пробелы ангиогенеза, но и в практической медицине при коррекции пороков верхней конечности.

## К ВОПРОСУ О ТОПОГРАФИИ НЕКОТОРЫХ ПРИСТЕНОЧНЫХ ВЕТВЕЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ

***Яхо Л.И.***

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь*

*Кафедра анатомии человека*

*Научный руководитель – ст. преподаватель Щербакова М.Н.*

Методом макропрепарирования на 10 трупах взрослых людей обоего пола изучались поясничные и срединная крестцовая артерии.

Во всех исследуемых случаях 4 пары поясничных артерий отходили от задней стенки брюшной аорты, имели горизонтальное направление, проходили позади симпатического ствола и направлялись к мышцам задней брюшной стенки. На 1 трупе присутствовали 5-е поясничные артерии, отходящие от общих подвздошных артерий.

Как правило, верхние поясничные артерии располагались на уровне межпозвоночного диска между XII грудным и I поясничным позвонками, нижние – на уровне тела IV поясничного позвонка.

В двух случаях 3-и поясничные артерии, правая и левая, отходили в одном месте, практически одним стволом. В одном случае правая нижняя поясничная артерия отходила от левой тонким стволиком.

Срединная крестцовая артерия присутствовала всегда. Местом отхождения ее была задняя стенка аорты выше бифуркации на 0,5-1 см, за исключением трех случаев, когда она отходила от нижних поясничных артерий: в двух случаях – от левой, и в одном – от правой.

## ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В ВОПРОСАХ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ

***Хилько О.С., Сазонова Н.В., Устинова О.С.***

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь*

*Кафедра акушерства и гинекологии*

*Научный руководитель - д.м.н., профессор Кажина М.В.*

**Актуальность** темы связана с возрастанием во всем мире интереса к гормональной контрацепции.

**Целью** работы было выявление информированности женщин репродуктивного возраста в вопросах гормональной контрацепции.

**Материал и методы:** анкетирование 70 женщин репродуктивного возраста (18-45 лет) г. Гродно.

**Результаты.** Проанкетированные женщины были разделены на 2 группы. Первая группа - женщины, имеющие опыт приема комбинированных оральных контрацептивов (КОК), 18 человек (25,7%). Вторая группа - женщины, не принимавшие КОК, 52 человека (74,3%). Среди женщин первой группы преобладали женщины с



Репозиторий ГрГМУ

высшим образованием -66,7%, со средним образованием - 22,2%, и со средним специальным - 11,1%. Среди женщин, не принимавших КОК, высшее образование имели - 34,6%, среднее специальное - 25,0%, среднее - 19,2%, не имели образования - 1,9%. Источник информации о существовании КОК: у женщин с высшим образованием наиболее часто встречался ответ «узнала от подруг» - 21,25%, «от гинеколога» - 17,5%, «из СМИ» - 16,25%, «от знакомых» - 11,25%, «из журналов» - 22,5%, «самостоятельно принимали» - 6,25%, «от терапевта» - 3,75%, не знают о КОК - 1,25% респондентов. Среди женщин со средним специальным образованием наиболее часто встречался ответ «от гинеколога» - 32,5%, «от подруг» - 17,5%, «от знакомых» - 15%, «из СМИ» - 12,5%, «не знают о КОК» - 5%, «из журналов» - 17,5%. Среди женщин со средним образованием преобладали ответы «из журналов» и «от гинеколога» по - 22,7 %, далее следуют ответы «от подруг» - 18,2%, «из СМИ» - 13,6%, «от знакомых» - 9,1%, «не знают о существовании гормональной контрацепции» - 13,6%.

**Выводы:** выявлено, что КОК ограниченно используются женщинами репродуктивного возраста. Это связано с недостаточной информированностью женщин в вопросах контрацепции. По результатам исследования установлено, что уровень информированности не связан с уровнем образования.

Репозиторий ГрГМУ