

and Prusakova's «Emotional Self-Portraits» (graphical expression). Cluster analysis revealed distinct cognitive and emotional profiles, with statistically significant associations between higher and balanced cognitive performance and more accurate verbal emotion categorization and detailed graphical expression. These findings support the integrative nature of cognitive processes and the unity of affect and intellect, consistent with L. S. Vygotsky's cultural-historical theory.

РЕАКЦИЯ РОДСТВЕННИКОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ШИЗОФРЕНИИ

Стрелков О.Г.

*Гродненский государственный медицинский университет,
Гродно, Беларусь*

Введение. Шизофрения затрагивает около 24 миллионов человек в мире, что соответствует 1 из 300 (0,32%) населения планеты [1]. Начинается заболевание в возрасте от 20-30 лет. Это психическое расстройство сопровождается значительным снижением активности в семейной жизни, социальных взаимодействиях, учебе и профессиональной деятельности. Ухудшение функциональности, связанное с прогрессированием заболевания, приводит к социальным и экономическим трудностям пациента, что становится тяжёлым бременем для их семей.

Цель. Изучить реакцию семьи на родственника, заболевшего шизофренией, используя анализ доступных литературных источников.

Методы исследования. Проанализированы тематические публикации, имеющиеся в электронных ресурсах Cyberleninka, Pubmed, РМС, Elibrary, JAMA.

Результаты и их обсуждение. Основная реакция семьи на заболевшего шизофренией родственника – горе, траур [2]. Семейная динамика при хроническом заболевании осложняется диссонансом между пониманием болезни и стремлением сохранить прежний образ жизни пациента [3]. Зачастую родственники склонны преуменьшать серьезность и развитие недуга, что может негативно сказаться на течении заболевания [4]. Особую боль вызывает утрата эмоциональной связи с человеком, который физически жив, что делает процесс переживания более сложным и трудноразрешимым. Принятие болезни у близкого человека усугубляется стигматизацией психических расстройств. Показательным является тот факт, что примерно половина родителей и супругов пациентов, недавно госпитализированных в психиатрические учреждения, скрывали этот факт [5].

Выводы: Следовательно, реакция горя в ответ на болезнь родственника представляет собой комплекс социальных и когнитивных процессов, глубоко укорененных в культуре. Тем не менее, это неизбежный этап, который семья должна преодолеть для принятия диагноза психического заболевания у одного из ее членов. Это диктует необходимость создания инновационных программ

лечения и реабилитации, направленных на улучшение качества медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами.

Литература

1. Institute of health Metrics and Evaluation. Global Health Data Exchange. – URL: <http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool?params=gbd-api-2019-permalink/27a7644e8ad28e739382d31e77589dd7> (date of access 30.12.2025).
2. Tessler, R. C. Stages in family response to mental illness: An ideal type. / R. C. Tessler, L. M. Killian, G. D. Gubman // Psychosocial Rehabilitation Journal. – 1987. – Vol. 10, № 4. – P. 3-16. – doi: 10.1037/h0099599.
3. Wynne, L. C. The rationale for consultation with the families of schizophrenic patients. / L. C. Wynne // Acta Psychiatr Scand Suppl. – 1994. – Vol 384. – P. 125-32. – doi: 10.1111/j.1600-0447.1994.tb05901.x.
4. Parkes, C. M. Facing loss / C. M. Parkes // BMJ. – 1998. – Vol. 316. – P. 1521-1524. – doi: 10.1136/bmj.316.7143.1521.
5. Phelan, J. C. Psychiatric illness and family stigma. / J. C. Phelan, E. J. Bromet, B. G. Link // Schizophr Bull. – 1998. – Vol. 24, № 1. – P. 115-26. – doi: 10.1093/oxfordjournals.schbul.a033304.

REACTIONS OF RELATIVES TO THE DEVELOPMENT OF SCHIZOPHRENIA

Strelkov O.G.

*Grodno State Medical University
Grodno, Belarus*

The grief response to a relative's illness is a complex social and cognitive process deeply rooted in culture. However, it is an inevitable stage that a family must go through to accept the diagnosis of a mental illness in one of its members. This necessitates the creation of innovative treatment and rehabilitation programs aimed at improving the quality of medical care for patients with mental disorders.

СЕМЬЯ ПАЦИЕНТА С ШИЗОФРЕНИЕЙ КАК ФАКТОР ДЕБЮТА ЗАБОЛЕВАНИЯ

Стрелков О.Г.

*Гродненский государственный медицинский университет,
Гродно, Беларусь
strelkov@tut.by*

Введение. Шизофрения – серьёзное психическое расстройство, которым в мире страдают около 24 миллионов человек, что составляет 0,32% населения