

$p < 0.05$. Это указывает на высокую активность ангиогенеза при физиологической беременности и его важную роль в формировании и созревании системы мать-плацента-плод.

Выводы. Уровень экспрессии VEGF в децидуальной ткани пациенток с ранним невынашиванием беременности значимо ниже, чем при нормально протекающей беременности ($p < 0,05$). Полученные данные ясно указывают на важность достаточного уровня ангиогенеза в эндометрии для поддержания и благоприятного течения беременности, и этот маркер может быть использован в качестве прогностического.

ЛИТЕРАТУРА

1. Современные представления о нарушениях состояния эндометрия при привычном невынашивании / Т. А. Базиева, И. М. Ордынец, Б. А. Джабраилов, Р. У. Тунгузбиева // Медицинский вестник Юга России. – 2022. – Т. 13, № 4. – С. 53–57.
2. Association of angiogenic cytokines (VEGF-A and VEGF-C) and clinical characteristic in women with unexplained recurrent miscarriage / A. Bagheri, P. Kamath, P. Rao [et al.] // Bratisl Med J. – 2017. – Vol. 118, № 5. – P. 258–264.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЛАПСОМ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Афанасьева А. А.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: Савчук Е. М.

Актуальность. Нарушения функции тазового дна влияют на качество жизни миллионов людей во всем мире. В частности, проблема пролапса органов малого таза является довольно распространенным гинекологическим расстройством, которое активно изучается в современной медицине. Исследования в данном направлении приводят к появлению новых диагностических методик, внедрению международных классификаций и малоинвазивных технологий. Расширение профессионального дискурса в свою очередь способствует формированию и активному использованию новых англоязычных терминологических единиц, которые представляют собой актуальный и вызывающий интерес предмет исследования [1].

Цель. Целью исследования является словообразовательный и семантический анализ англоязычных терминологических единиц, используемых в научных публикациях по проблеме пролапса органов малого таза.

Методы исследования. В ходе исследования использовались: метод сплошной выборки, элементы количественного анализа, структурно-семантический анализ, сравнительно-сопоставительный метод.

Результаты и их обсуждение. Результатом нашего исследования является описание семантики и словообразовательный анализ 85 терминологических единиц, связанных с пролапсом органов малого таза. В ходе семантического анализа были выделены следующие группы терминов.

1. Термины, обозначающие различные формы и локализации пролапса: pelvic organ prolapse, cystocele, rectocele, urethrocele.

2. Термины классификации и диагностики: POP-Q system, pelvic floor assessment, Valsalva maneuver, pelvic support levels. 3. Термины, связанные с современными подходами к лечению: pessary fitting, reconstructive pelvic surgery, mesh repair. Основными способами словообразования исследованных единиц являются: 1. Синтаксический способ (65%): deep dyspareunia, obstructed intercourse, vaginal laxity, pelvic floor muscle training, stress urinary incontinence, minimally invasive surgery. Наиболее частотные модели включают конструкции A + N и A + A + N. 2. Морфологический способ путем словосложения (20%): hematuria (hemat- + -uria), dysuria (dys- + -uria), nocturia (noct- + -uria), dyspareunia (dys- + para- + eunia), coccydynia (coccy- + -dynia).

3. Морфологический способ путем аффиксации (10%): urgency (-ency), hesitancy (-ancy), constipation (-ion), stiffness (-ness); incontinence (in-), disability (dis-), revoid (re-).

4. Семантический способ путем метафоризации (3%): dribbling, spraying, splinting, bashful» bladder.

5. Морфологический способ путем аббревиации (2%): акронимы EMG (electromyography), POP (pelvic organ prolapse), PFM (pelvic floor muscle).

Выводы. Проведённый семантический анализ позволил выделить три основные группы англоязычных терминов: термины, обозначающие виды пролапса; термины диагностики и классификации; термины, связанные с лечением. Наиболее продуктивными способами словообразования являются синтаксический способ, а также морфологический путем словосложения и аффиксации. Таким образом, терминология в области пролапса органов малого таза отличается высокой степенью стандартизации и международной унификацией, что обусловлено необходимостью клинической точности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лазута, Г. С. Проблема дистензии тазовых органов и генитального пролапса I–II степени у женщин репродуктивного возраста и в постменопаузе (обзор литературы) / Г. С. Лазута, А. Л. Гурин // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2023. – Т. 21, № 3. – С. 222–230.