

СПЕКТР ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ, ВОЗНИКШЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Горбач В. Б.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Гулько О. В.

Актуальность. Частым коморбидным состоянием у пациентов с внебольничной пневмонией (ВП) является хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Клиническая картина ХОБЛ может маскировать проявления ВП, что приводит к несвоевременной верификации и лечению последней [1]. *Streptococcus pneumoniae* является одной из наиболее распространенных причин как ВП, так и обострений ХОБЛ. *Haemophilus influenzae* также ассоциируется с ВП на фоне ХОБЛ (ВП+ХОБЛ) [2].

Цель. Провести анализ результатов бактериологического исследования мокроты и бронхоальвеолярного смыва у пациентов с ВП+ХОБЛ

Методы исследования. Ретроспективный анализ медицинских карт стационарного пациента 25 человек, госпитализированных в пульмонологическое отделение УЗ «Гродненская областная клиническая больница медицинской реабилитации» в 2024-2025 годах с диагнозом ВП+ХОБЛ. Проведено микробиологическое исследование, материалом для которого служила мокрота 72% (18 пациентов) и бронхоальвеолярный смыв 28% (7 пациентов). Выделение и идентификация возбудителя, определение чувствительности к антибиотикам производилась на микробиологическом анализаторе «Vites» согласно действующим рекомендациям. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica 10.0. Полученные результаты представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартилей (Me [LQ; UQ]) при распределении, отличающемся от нормального (нормальность распределений проверялась при помощи критерия Лиллиефорса), а также в виде абсолютных и относительных значений.

Результаты и их обсуждение. При анализе медицинских карт стационарного пациента количество женщин составило 28% (7 пациенток), а мужчин соответственно 72% (18 пациентов). Медиана возраста госпитализированных составила 66,0 [63,0; 75,0] лет. Основным клиническим диагнозом устанавливался на основании наличия пневмонической инфильтрации при лучевом исследовании легких. Диагноз ХОБЛ подтвержден данными анамнеза, клиническими показателями, данными функции внешнего дыхания ($ОФВ_1/ФЖЕЛ < 0,7$). В результате микробиологического исследования у всех пациентов получен рост микроорганизмов. У 25 пациентов с ВП+ХОБЛ было выделено 6 разных видов микроорганизмов, причем во всех 25 (100%) случаях выделен монокультурный возбудитель. *Streptococcus* spp. выделен у 10 (40%)

пациентов, *Klebsiella* spp. у 7 (28%) пациентов, на третьем месте дрожжеподобные грибы у 5 (20%) пациентов, *Pseudomonas aeruginosa* у 1 (4%) пациента, микроорганизм семейства Enterobacteriaceae у 1 (4%) пациента, *Proteus mirabilis* – у 1 (4%) пациента.

Выводы. Представители рода *Streptococcus* остаются наиболее распространенным бактериальным патогеном, вызывающим ВП у пациентов, страдающих ХОБЛ. Однако дрожжеподобные грибы и представители рода *Klebsiella* оказывают существенную роль в возникновении заболевания, что может повлиять на течение патологии и длительность госпитализации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Внебольничная пневмония у пациентов с ХОБЛ: временная коморбидность или фактор риска летального исхода? / О. М. Урясьев, Ю. А. Панфилов, Я. Н. Гринькова [и др.] // Актуальные проблемы медицины. – 2020. – Т. 43, № 1. – С. 28-37.
2. Хроническая обструктивная болезнь легких и внебольничная пневмония: современные взгляды и клинические аспекты / А. С. Белоусов, О. В. Фесенко, Н. В. Стуров [и др.] // Эффективная фармакотерапия. – 2025. – Т. 21, № 40. – С. 54-61.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЗА ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

Гордейко А. М.

Барановичская центральная поликлиника
Научный руководитель: Матейчик Л. А.

Актуальность. За 2024 г. в г. Барановичи среди несовершеннолетних зафиксирован пик отравлений алкоголем с оказанием им медицинской помощи в отделении реанимации УЗ «Барановичская детская городская больница» (далее – Барановичская ДГБ) и последующим взятием их под профилактическое наблюдение в УЗ «Барановичская центральная поликлиника» Барановичский межрайонный наркологический диспансер (далее – Барановичский МНД).

Цель. Проанализировать качество оказания профилактической наркологической помощи несовершеннолетним лицам в 2024-2025 гг.

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт несовершеннолетних пациентов, которым за период 2024-2025 гг. была оказана медицинская помощь в УЗ Барановичская ДГБ по причине острой интоксикации (F10.0) и отравления алкоголем (T51.0) [1].

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа, за 2024 г. в УЗ Барановичская ДГБ зарегистрировано 13 случаев оказания медицинской помощи несовершеннолетним с диагнозом F10.0, в связи с T51.0 – 7 случаев. 1 несовершеннолетней пациентке медицинская помощь оказывалась трижды: