

пациентов, *Klebsiella* spp. у 7 (28%) пациентов, на третьем месте дрожжеподобные грибы у 5 (20%) пациентов, *Pseudomonas aeruginosae* у 1 (4%) пациента, микроорганизм семейства Enterobacteriaceae у 1 (4%) пациента, *Proteus mirabilis* – у 1 (4%) пациента.

Выводы. Представители рода *Streptococcus* остаются наиболее распространенным бактериальным патогеном, вызывающим ВП у пациентов, страдающих ХОБЛ. Однако дрожжеподобные грибы и представители рода *Klebsiella* оказывают существенную роль в возникновении заболевания, что может повлиять на течение патологии и длительность госпитализации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Внебольничная пневмония у пациентов с ХОБЛ: временная коморбидность или фактор риска летального исхода? / О. М. Урясьев, Ю. А. Панфилов, Я. Н. Гринькова [и др.] // Актуальные проблемы медицины. – 2020. – Т. 43, № 1. – С. 28-37.
2. Хроническая обструктивная болезнь легких и внебольничная пневмония: современные взгляды и клинические аспекты / А. С. Белоусов, О. В. Фесенко, Н. В. Стуров [и др.] // Эффективная фармакотерапия. – 2025. – Т. 21, № 40. – С. 54-61.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЗА ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

Гордейко А. М.

Барановичская центральная поликлиника
Научный руководитель: Матейчик Л. А.

Актуальность. За 2024 г. в г. Барановичи среди несовершеннолетних зафиксирован пик отравлений алкоголем с оказанием им медицинской помощи в отделении реанимации УЗ «Барановичская детская городская больница» (далее – Барановичская ДГБ) и последующим взятием их под профилактическое наблюдение в УЗ «Барановичская центральная поликлиника» Барановичский межрайонный наркологический диспансер (далее – Барановичский МНД).

Цель. Проанализировать качество оказания профилактической наркологической помощи несовершеннолетним лицам в 2024-2025 гг.

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт несовершеннолетних пациентов, которым за период 2024-2025 гг. была оказана медицинская помощь в УЗ Барановичская ДГБ по причине острой интоксикации (F10.0) и отравления алкоголем (T51.0) [1].

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа, за 2024 г. в УЗ Барановичская ДГБ зарегистрировано 13 случаев оказания медицинской помощи несовершеннолетним с диагнозом F10.0, в связи с T51.0 – 7 случаев. 1 несовершеннолетней пациентке медицинская помощь оказывалась трижды:

2 раза – с диагнозом F10.0, 1 раз – с диагнозом T51.0. Под профилактическое наркологическое наблюдение взято 18 человек (10 девочек и 8 мальчиков) в возрасте от 13 до 17 лет (средний возраст – 15,5 лет). Из них 8 человек – учащиеся учреждений общего среднего образования, 10 человек – профессионально-технического и среднего специального образования. Средний показатель этанола в крови составил 1,57‰ (самый высокий – 2,234‰, самый низкий – 0,246‰). 10 несовершеннолетних имели в анамнезе повторные случаи употребления алкоголя.

За 2025 г. зарегистрировано 13 случаев оказания медицинской помощи подросткам по поводу F10.0, однако случаев отравления (T51.0) не зафиксировано. Под профилактическим наблюдением нарколога оказалось 12 человек (4 девочки и 8 мальчиков) в возрасте от 14 до 17 лет (средний возраст – 16 лет). Из них 4 учащихся учреждений общего среднего образования, 8 – учащихся профессионально-технического и среднего специального образования. Средний показатель этанола в крови – 1,876‰ (самый высокий – 2,588 ‰, самый низкий – 1,207 ‰). Повторные случаи употребления алкоголя были лишь у 4 несовершеннолетних.

Со всеми подростками проведено мотивационное интервью на отказ от алкоголя, разъяснены медико-социальные последствия употребления алкоголя, консультации психолога. За 2024 г. с информационно-образовательными лекциями по проблеме употребления алкоголя проведено 40 выступлений (охвачено 2984 человека) для несовершеннолетних г. Барановичи и Барановичского района. В 2025 г. профилактическая работа была усилена – 58 выступлений (охвачено 4353 человека).

Выводы. В результате проведенных профилактических мероприятий количество случаев оказания медицинской помощи несовершеннолетним лицам в связи с F10.0 и T51.0 в УЗ Барановичская ДГБ за анализируемый период снизилось на 35%. Положительным фактором являлось усиление качества первичной и вторичной профилактики в детско-подростковой среде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акалаев, Р. Н. Острые отравления алкоголем. Эпидемиология, диагностика, лечение и анализ нерешенных проблем / Р. Н. Акалаев, А. А. Стопницкий, Х. Ш. Хожиев // Вестник экстренной медицины. – 2017. – № 1. – С. 104-111.