

(гранулоциты, агранулоциты, фибробласты и фиброциты). Формирование рыхлой соединительной ткани.

Выводы. Наиболее эффективным методом укрытия раны толстой кишки является оментопластика. НИЛИ снижает интенсивность воспаления, выступает как биостимулятор.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хирургическая тактика при травматических повреждениях толстой кишки / В. М. Тимербулатов, Р. Н. Гареев, Р. Р. Фаязов [и др.] // Медицинский альманах. – 2015. – № 1(36). – С. 60-62.
2. Нечипуренко, Н. И. Механизмы действий и биологические эффекты низкоинтенсивного лазерного излучения / Н. И. Нечипуренко // Медицинские новости. – 2008. – № 12. – С. 17–21.

МЕЛАНОМА: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ГОРОДУ ГРОДНО И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2025 ГОД

Гуменюк Е. В., Натынчик А. В.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. мед. наук Карпуть И. А.

Актуальность. Меланوما кожи остаётся одной из наиболее злокачественных опухолей человека, характеризующейся высокой агрессивностью, быстрым прогрессированием и неблагоприятным прогнозом при поздней диагностике. Несмотря на относительную редкость по сравнению с другими злокачественными новообразованиями, именно меланوما вносит значительный вклад в показатели онкологической смертности. В условиях роста заболеваемости особое значение приобретает анализ региональных эпидемиологических показателей, позволяющий оценить эффективность программ раннего выявления, качество оказания медицинской помощи и динамику выживаемости [1]. Для практического здравоохранения такие данные служат основой для планирования профилактических мероприятий и совершенствования маршрутизации пациентов [2].

Цель. Осуществить эпидемиологический анализ заболеваемости меланомой в г. Гродно и Гродненской области за 2025 год, определить структуру стадий и морфологических форм, а также оценить показатели раннего выявления и выживаемости.

Методы исследования. Исследование выполнено на основе данных регионального онкологического регистра. В анализ включены все пациенты с впервые выявленной меланомой кожи за 2025 год, а также сведения о кумулятивной заболеваемости и выживаемости.

Результаты и их обсуждение. Общая заболеваемость: на конец 2025 года на учёте состояло 949 пациентов с меланомой; пятилетняя выживаемость составила 58,2%. Новые случаи: в 2025 году зарегистрировано 116 случаев меланомы, из них с III–IV стадиями – 9 пациентов (7,8%). Раннее выявление составило 89,7%. Одногодичная летальность – 4,9%. Гендерные различия: мужчины – 42 случая (I стадия – 40,5%; II стадия – 45,2%; III стадия – 2,4%; IV стадия – 7,1%); женщины – 74 случая (I стадия – 52,7%; II стадия – 39,2%; III стадия – 1,4%; IV стадия – 5,4%). Морфологическая структура: меланома БДУ – 37,4%; узловая – 30,4%; поверхностно распространяющаяся – 26,1%; лентиго-меланома – 1,7%; акральная лентигозная – 1,7%; метастатическая – 2,6%.

Выводы. В 2025 году в городе Гродно и Гродненской области зарегистрировано 116 новых случаев меланомы кожи, что подтверждает актуальность данной патологии для региона. Большинство пациентов выявлены на ранних стадиях, что отражает высокий уровень настороженности врачей и доступность диагностических мероприятий. Одногодичная летальность составила 4,9%, что свидетельствует о сравнительно низкой смертности в первый год наблюдения, а пятилетняя выживаемость – 58,2%, что подчёркивает сохраняющуюся неблагоприятную долгосрочную перспективу заболевания. Морфологическая структура характеризуется преобладанием узловой и поверхностно распространяющейся форм при значительной доле меланомы без уточнённой формы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Файзиев, Ф. Ш. Эпидемиология меланомы кожи и проблемы лечения (обзор литературы) / Ф. Ш. Файзиев, У. Х. Рустамов // Journal of Biomedicine and Practice. – 2018. – № 4. – С. 56–59.
2. Рак в Беларуси: цифры и факты. Анализ данных Белорусского канцер-регистра за 2012–2021 гг. / А. Е. Океанов [и др.] ; под ред. А. Е. Океанова. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2023. – 296 с.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОРОЖДЕННЫХ С НЕОНАТАЛЬНОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Гурина Р. В.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Калинова А. П.

Актуальность. Неонатальная желтуха – это патологическое состояние у новорожденных, наблюдаемое у 60–80% доношенных и 80–90% недоношенных детей, связанное с повышением уровня билирубина. Без должной терапии, при