

2. Рецидив заболевания появляется чаще (62%) в ранние сроки (до 18 месяцев от первого лечения).

3. У пациентов с рецидивом опухоли, возникшим более чем через 18 месяцев после завершения первичного лечения, отмечалось достоверное удлинение продолжительности жизни по сравнению с пациентами с рецидивом опухоли до 18 месяцев после первичного лечения ($p<0,05$).

4. При позднем (более 18 месяцев) рецидиве заболевания оперативное лечение (ларингэктомия) достоверно удлиняет продолжительность жизни в сравнении с группой пациентов без лечения ($p<0,05$).

ЛИТЕРАТУРА

1. Рак в Беларуси: цифры и факты. Анализ данных Белорусского канцер-регистра за 2015–2024 гг. / А. Е. Океанов, П. И. Моисеев, Л. Ф. Левин [др.] ; под ред. С. Л. Полякова. – Минск : Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, 2025. – 283 с.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ: ОЦЕНКА 10-ЛЕТНЕГО ОПЫТА РАБОТЫ ГРОДНЕНСКОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ

Дулько О. С., Мелюк М. А., Прокопчик А. С.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Белюк К. С.

Актуальность. В настоящее время наблюдается тенденция роста количества пациентов страдающих хронической болезнью почек (ХБП). При этом оптимальным методом лечения ХБП является трансплантация почки, что ставит её в число актуальных проблем современной медицины [1].

Цель. Оценить результаты 10-летнего периода трансплантации почки в Гродненской области.

Методы исследования. За 10-летний период работы отделения с 1 января 2013 г. по 1 января 2023 г. при участии сотрудников клиники и 1-й кафедры хирургических болезней ГрГМУ всего было выполнено 287 гетеротопических трансплантаций трупной почки. В 171 (59,6%) случае реципиентом были мужчины, а в 116 (40,4%) – женщины. Возраст пациентов варьировал от 18 до 74 лет (средний возраст – $45,66\pm 11,6$ года). Операцию гетеротопической трансплантации трупной почки в большинстве случаев проводили по стандартной методике в правую подвздошную ямку забрюшинно, соединяя сосуды донорской почки с наружными подвздошными артерией и веной реципиента «конец в бок».

Результаты и их обсуждение. Хирургические осложнения после трансплантации развились в 51 (17,8%) случае: уринома – 8 (2,79%), лимфоцеле – 6 человек (2,09%), тромбоз сосудов у 8 пациентов (2,79%), отмечено 7 эпизодов

(2,44%) гематомы в ложе трансплантата, 5 (1,74%) – раневой инфекции, 4 (1,39%) – пузырно-мочеточникового рефлюкса, 4 (1,39%) – хирургических кровотечений, стриктура мочевыводящих путей (МВП) обнаружена в 3-х наблюдениях (1,04%). Доля трансплантаций почки без хирургических осложнений составила 82,2%.

Терапевтические осложнения в послеоперационном периоде были выявлены у 69 (24,04%) пациентов. Отторжение почечного трансплантата наблюдалась в 23 (8,01%) случаях, замедленная функция почечного трансплантата – в 9 (3,14%), артериальная гипертензия возникла у 8 (2,79%) человек, сахарный диабет (СД) de novo – у 7 (2,44%) пациентов, у 6 (2,09%) реципиентов было обнаружено стероидрезистентное отторжение почечного трансплантата; диспепсия, диарея, рвота отмечены у 7 (2,44%), 5 (1,74%) и 2 (0,7%) человек соответственно. У 218 (75,96%) пациентов терапевтических осложнений отмечено не было.

За десятилетний период умерло 57 (19,86%) пациентов. Если рассматривать пятилетнюю выживаемость, то общая статистика по областям составляет в среднем около 86%, Гродненская область демонстрирует высокие показатели пятилетней выживаемости – (93%).

Выводы. Согласно представленным данным, можно отметить, что общие показатели работы трансплантатологической службы УЗ «Гродненская университетская клиника» находятся на уровне ведущих мировых стандартов. Отмечается высокая выживаемость пациентов после пересадки. Количество хирургических и терапевтических осложнений соответствуют Республиканским и мировым данным. Высокий уровень летальных исходов в 2020 и 2021 гг. объясняется пандемией COVID-19, однако коронавирусная инфекция повысила эти показатели во всем мире.

ЛИТЕРАТУРА

1. Батюшин, М. М. Хроническая болезнь почек: современное состояние проблемы / М. М. Батюшин // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2020. – Т. 16, № 6. – С. 938-947.

ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ СОСУДОВ ДОНОРСКИХ ПОЧЕК

Дулько О. С., Мелюк М. А.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Белюк К. С.

Актуальность. За 2022 год было проведено 102149 трансплантаций почек во всем мире. При этом по разным данным в 3,3-47% случаев были обнаружены индивидуальные сосудистые вариации внеорганных сосудов почки.