

Выводы. Известны различные способы сохранения селезенки, однако они либо малоэффективны, либо требуют специального дорогостоящего оборудования. Поэтому оправдано применение аутолиентрансплантации, выполнение которой технически не сложно, позволяет минимизировать нежелательные эффекты, развивающиеся после спленэктомии. Осложнений, связанных с аутолиентрансплантацией, в послеоперационном периоде отмечено не было.

ЛИТЕРАТУРА

1. Одишелашвили, Г. Д. Хирургическое лечение повреждений селезенки / Г. Д. Одишелашвили, Д. В. Пахнов, Л. Г. Одишелашвили // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2023. – Т. 213, № 5. – С. 100–107. – doi: 10.31146/1682-8658-ecg-213-5-100-107.

ДВОЙНАЯ БЛОКАДА HER2-РЕЦЕПТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Егоров А. А.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Патюпо Е. О.

Актуальность. Рак молочной железы является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности среди женщин в Республике Беларусь. Особое значение имеет HER2-позитивный тип рака молочной железы, который характеризуется высокой агрессивностью, быстрым прогрессированием и склонностью к раннему метастазированию [1].

Цель. Оценить результаты лечения рака молочной железы с использованием схемы пертузумаб + трастузумаб в Гродненской области.

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ базы данных с 2022 по 2025 год, выделены 64 пациента с подтверждённым HER2-позитивным раком молочной железы, у которых в медикаментозной терапии использовалась комбинация пертузумаб + трастузумаб (Фесго). Проведён описательный статистический анализ демографических и клинических параметров, характеристик опухоли и исходов.

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов варьировал от 34 до 85 лет, средний возраст составил $55,0 \pm 12,4$ года (медиана – 54,0 года). Наибольшая часть пациентов (62,5%) находилась в возрастной группе 45–65 лет. Распределение по молекулярным подтипам проводилось на основании данных иммуногистохимического (ИГХ) исследования и FISH-реакции: 1) Нелюминальный HER2-позитивный подтип диагностирован у 29 пациентов (45,3%). 2) Люминальный В HER2-позитивный подтип (с экспрессией рецепторов эстрогена от 3% до 96%) выявлен у 32 пациентов (50%). 3) Прочие варианты (включая случаи смены фенотипа или дискордантности статуса

HER2/neu) отмечены у 3 пациентов (4,7%), из которых у 1 пациента (1,6%) на этапе текущего анализа зарегистрирован статус, соответствующий люминальному А подтипу, а у 1 (1,6%) зафиксирован полный патоморфологический ответ (pCR) с потерей HER2-экспрессии. Отдаленные метастазы на момент включения в анализ имели 45 пациентов (70,3%). Висцеральные метастазы с поражением двух и более органов отмечены у 17 пациентов (26,6%), что свидетельствует об агрессивности заболевания. Комбинация пертузумаб + трастузумаб использовалась в качестве паллиативной помощи у 33 пациентов (51,6%), как неоадьювантная химиотерапия (НАХТ) – у 24 (37,5%), адьювантная терапия – у 4 (6,3%). Последовательное применение в неоадьювантном и адьювантном режимах – 3 пациента (4,7%). Профиль безопасности характеризовался хорошей переносимостью. Полный патоморфологический ответ (pCR, RCB-0) отмечен у 5 пациентов (7,8%).

Выводы. Повышение эффективности диагностики и терапии HER2-позитивного рака молочной железы является приоритетной задачей современной онкологии в Республике Беларусь, что требует комплексного подхода, включая раннее выявление, применение таргетных препаратов и мониторинг клинического ответа.

ЛИТЕРАТУРА

1. HER2/neu-позитивный рак молочной железы: актуальность и роль таргетной терапии / А. А. Шурпач, С. А. Красный, А. О. Хоров [и др.] // Онкологический журнал. – 2021. – Т. 15, № 2(58). – С. 48-54. –

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КЛЕЩЕВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ОТ УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЗАРАЖЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ В ЭНДЕМИЧНОМ РЕГИОНЕ

Емельянович К. О.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Потапчик А. Л.

Актуальность. В последние десятилетия отмечается подъем уровня заболеваемости клещевыми инфекциями (КИ) как в Гродненской области, так и в Республике Беларусь в целом [1]. Также регистрируются случаи микс-инфекций. Количество изолированных случаев заболеваний анаплазмозом и эрлихиозом практически не зарегистрировано.

Цель. Выявить взаимосвязь уровня заболеваемости КИ от естественной зараженности иксодовых клещей возбудителями наиболее распространенных инфекционных заболеваний в природных очагах Гродненского района за 2014-2015 гг и 2024-2025гг.