

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА (1991-2025): ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ерматова С. Г., Саломова Ф. И.

Ташкентский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Шеркузиева Г. Ф.

Актуальность. Система здравоохранения Узбекистана прошла сложный путь трансформации от советской модели Семашко к современной многоукладной системе. Изучение этапов реформирования представляет научный и практический интерес, поскольку опыт страны отражает общие закономерности постсоветских преобразований в здравоохранении Центральной Азии [1].

Цель. Проанализировать ключевые этапы реформирования системы здравоохранения Узбекистана за 1991-2025 гг. и оценить их влияние на показатели общественного здоровья.

Методы исследования. Применялись ретроспективный и сравнительный анализ нормативно-правовых актов, систематизация данных официальных отчётов ВОЗ и результатов рецензируемых научных публикаций [2].

Результаты и их обсуждение. Реформирование прошло четыре этапа.

Первый (1991-1998): кризис переходного периода – расходы на здравоохранение сократились на 50%, возник дефицит медикаментов и отток кадров. Принятый Закон «Об охране здоровья граждан» (1996, № 265-I) и Государственная программа реформирования (1998, УП-2107) заложили правовую основу преобразований.

Второй этап (2000-2016): структурные реформы ПМСП – внедрение института семейного врача, оптимизация стационарного сектора, рост бюджетных расходов на медицину до 11,1% (2006).

Третий этап (2017-2021): по Стратегии действий (УП-4947) открыты 793 семейные поликлиники, модернизирована скорая помощь, частный сектор вырос до 5 300 клиник [3].

Четвёртый этап (2019-2025): в рамках «Цифровой Узбекистан – 2030» внедрены электронные медкарты (12+ млн записей) и телемедицина; запущено пилотное обязательное медицинское страхование (ОМС) в Сырдарьинской области [2].

Демографические итоги 34 лет: материнская смертность снизилась в 4,4 раза (65,3 → 14,8 на 100 тыс. живорождений), младенческая – в 4,7 раза (35,5 → 7,5 на 1 000 живорождений), ожидаемая продолжительность жизни выросла с 66,4 до 71,9 лет. Вместе с тем сохраняются проблемы: неравный доступ в сельских районах, дефицит кадров, незавершённость перехода к страховой модели [1, 4].

Выводы. Последовательная трансформация системы здравоохранения Узбекистана обеспечила значительное улучшение демографических показателей. Дальнейший прогресс определяется завершением внедрения ОМС, устранением региональных диспропорций и продолжением цифровизации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Historical evolution of healthcare systems of post-Soviet states / Y. Semenova, L. Lim, Z. Salpynov [et al.] // Heliyon. – 2024. – Vol. 10. – P. e31074.
2. Robinson, S. Health Systems in Action: Uzbekistan, 2024 edition / S. Robinson, J. Yin. – Geneva : WHO, 2025. – 28 p.
3. Abdurashidovna, M. F. The evolution of medicine and medical law: From ancient civilizations to modern Uzbekistan / M. F. Abdurashidovna // Journal of Angiotherapy. – 2024. – Vol. 8. – P. 1.
4. Махмудова, М. Р. Реформирование службы крови в Узбекистане: итоги и влияние на производственные показатели / М. Р. Махмудова // Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2025. – № 2. – С. 45-52.

ПРИМЕНЕНИЕ НПВС СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ефимчик А. А., Василюк А. А.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Коршак Т. А.

Актуальность. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) являются наиболее часто применяемыми анальгетиками и используются для облегчения состояния при заболеваниях соединительной ткани, головной и послеоперационной боли, коликах, дисменорее, онкологии, респираторных инфекциях [1, с. 7]. При этом НПВС предназначены только для контроля ноцицептивной боли, малоэффективны при невропатической и дисфункциональной боли [1, с. 10], а также имеют целый ряд нежелательных реакций, среди которых осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, почек [1, с. 11-17], а вопросы рационального применения и выбора НПВС до сих пор остаются актуальными.

Цель. Проанализировать применение НПВС студентами Гродненского государственного медицинского университета (ГрГМУ).

Методы исследования. Для исследования была разработана анкета, включающая в себя 4 вопроса. Анкетирование проводилось среди студентов ГрМУ на базе платформы Google forms, в опросе приняли участие 131 человек. Результаты обработаны с использованием методов параметрической статистики с помощью пакета анализа Excel 2019, данные представлены в абсолютных и относительных величинах, числа в скобках – (количество человек, % от общего числа опрошенных).