

Выводы. Ключевыми факторами, влияющими на субъективную оценку и восприятие эффективности стратегий к являются: сложности с выполнением трансовых методик и необходимость соблюдения определенного режима.

ЛИТЕРАТУРА

1. Matheson, E. M. Treatment of Chronic Insomnia in Adults / E. M. Matheson, B. D. Brown, A. O. DeCastro // Am Fam Physician. – 2024. – Vol. 109, № 2. – P. 154-160.
2. Савицкий, И. С. Объективная оценка эффективности коррекции легких и умеренных нарушений сна / И. С. Савицкий, А. С. Крот // Актуальные проблемы медицины : сборник материалов итоговой научно-практической конференции, Гродно, 29 января 2026 г. / редкол.: И. Г. Жук (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2026. – С. 232-234. – 1 CD-ROM.

ОБОСНОВАНИЕ СТЕРЕОТИПНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ УРОВНЕ ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Крот А. С.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: Марковцова О. А.

Актуальность. На данный момент актуальной темой для исследования в детской психиатрии являются расстройства аутистического спектра (РАС). Формирование стереотипов в обществе приводит к серьезным проблемам у детей с РАС и их родителей: нарушаются процессы социализации, снижается вероятность получения полноценного образования, появление коммуникационных барьеров, уход на общественную периферию и появление психологических проблем [1].

Цель. Определение обоснованности распространенных стереотипов о интеллекте детей с РАС через сравнительный анализ их содержания и данных о реальном уровне интеллекта.

Методы исследования. Анкета «Исследование представления о расстройствах аутистического спектра», анализ результатов детского варианта теста интеллекта Д. Векслера (WISC) в адаптации Ю. И. Филимоненко.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования мы проанкетировали 125 человек в возрасте от 18 лет, представителей разных профессий и сфер деятельности, не связанных с медициной. Исследуя уже существующие стереотипы, было выявлено, что большая часть респондентов (52,8%) согласна с тем, что аутизм – это болезнь. При этом вопрос взаимосвязи аутизма и гениальности вызывает согласие лишь у 8%, а 61 респондент (48,8%) сомневаются в том, что гениальность может быть вызвана РАС. Если же говорить о вопросах взаимосвязи РАС и умственной отсталости в представлении людей, не задействованных во врачебной сфере, можно утверждать, что мнение

неоднозначное: 63 респондента (50,4%) не согласны, что такая взаимосвязь существует, 41 респондент (32,8%) – сомневается. Вопросы, касающиеся синдрома Саванта и людей с РАС, вызвали больше сомнений (52%), что может говорить о неосведомлённости населения в этой сфере. Для определения обоснованности существующих стереотипов нами было проведено исследование, направленное на определение реального уровня интеллекта у детей с РАС. Выборку составили 50 респондентов в возрасте от 5 до 17 лет, у которых имелся выставленный диагноз, относящийся к рубрике расстройств аутистического спектра. В процессе исследования было выявлено, что 38% респондентов (19 детей) не справились с заданиями детского варианта теста Векслера, при этом 62% (31 исследуемый) смогли успешно их выполнить. Важно отметить, что среди тех детей, которые справились с заданиями, в результатах отмечается очевидное преобладание невербального интеллекта над вербальным – 94% (29 детей). При этом отмечается, что 12 респондентов (35% от выборки детей, осиливших задания) имеют лёгкую умственную отсталость, 5 респондентов (16%) – умеренную умственную отсталость. Из представленной выборки только 7 детей (23%) имеют нормальные показатели интеллекта.

Выводы. Взрослое население Республики Беларусь плохо осведомлено об особенностях интеллектуального развития детей с РАС и демонстрирует сомнение во всех представленных вопросах, и результаты исследования интеллекта у детей с РАС демонстрируют нам необоснованность существующих стереотипов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Темнова, Л. В. Особенности социализации лиц с расстройствами аутистического спектра и членов их семей / Л. В. Темнова, Е. С. Рожнова // Перспективы науки и образования. – 2022. – № 6 (60). – С. 352-366. – doi: 10.32744/pse.2022.6.20.

РАСЧЕТНЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

Кругликова Е. Р.

Гродненский государственный медицинский университет
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Дорохин К. М.,
канд. мед. наук, доц. Орехов С. Д.

Актуальность. Исследователи периоперационного стресс-ответа описывают большую эффективность регионарного обезболивания по сравнению с общей анестезией [1]. При выполнении однотипных операций с