

СЕМИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРЯМОГО ПРОТИВОВИРУСНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ГЕПАТИТЕ С В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Лапыш Д. Е.¹, Гурина Р. В.¹, Сидоренко А. Д.²

¹Гродненский государственный медицинский университет,

²Гродненская областная инфекционная клиническая больница

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Черняк С. А.

Актуальность. Анализ многолетнего опыта применения лекарственных средств прямого противовирусного действия (ЛСППД) позволяет выявить изменения в структуре пациентов и терапевтических подходах, что является важным для мониторинга эффективности программ элиминации хронического гепатита С на региональном уровне [1].

Цель. изучить демографическую структуру и проанализировать частоту назначения различных схем противовирусной терапии ЛСППД в 2019–2025 годах у пациентов с ХГС Гродненского региона.

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 3637 пациентов, направленных в консультативно-диспансерное отделение Гродненской областной инфекционной клинической больницы в 2019-2025 годах для решения вопроса о назначении противовирусной терапии ЛСППД.

Результаты и их обсуждение. Противовирусная терапия была назначена 386 пациентам в 2019 году, 549 – в 2020, 524 – в 2021, 514 – в 2022, 385 – в 2023, 673 – в 2024, 606 – в 2025 гг. С 2019 по 2025 год наблюдался общий рост доли мужчин среди пациентов: с 57,25% (221 из 386) в 2019 году до 67% (406 из 606) в 2025 году. Средний возраст пациентов демонстрировал колебания с общим восходящим трендом: от 48,1 лет в 2019 году до 50,9 лет в 2025 году, с минимумом в 2021 году (46,6 лет) и максимумом в 2023 году (51,3 лет). Среди схем противовирусной терапии ХГС чаще всего назначалась комбинация софосбувир + даклатасвир. В 2019 году данная схема была назначена 345 пациентам (89,4%), в 2020 году – 351 пациенту (63,9%), в 2022 году – 481 пациенту (93,6%), в 2023 году – 382 пациенту (99,2%), в 2024 году – 638 пациентам (94,8%), в 2025 году – 464 пациенту (76,6%). Только в 2021 году большинство пациентов получили комбинацию софосбувир + велпатасвир (347 пациентов, 66,2%); в остальные годы доля пациентов, получавших данную схему, колебалась от 0,26% (в 2022 году) до 36,1% (в 2020 году). Другие комбинации ЛСППД (софосбувир + ледипасвир, глекапревир + пибрентасвир, софосбувир + глекапревир + пибрентасвир) назначались редко (максимальное значение – 1,16% в 2025 году), и использовались (за исключением схемы софосбувир + ледипасвир) для повторной терапии ХГС после предшествующей неудачи лечения. По имеющимся сведениям, эффективность противовирусной терапии превысила 95%.

Выводы. Среди пациентов с ХГС, которым назначалась противовирусная терапия в 2019-2025 годах преобладали мужчины (с тенденцией роста их доли по годам); средний возраст пациентов колебался от 46,6 до 51,4 лет; в терапии наиболее часто использовалась комбинация софосбувир + даклатасвир.

ЛИТЕРАТУРА

1. Особенности эпидемиологической ситуации по парентеральным вирусным гепатитам в Республике Беларусь / В. С. Высоцкая, Н. Д. Коломиец, И. Н. Глинская [и др.] // Гепатология и гастроэнтерология. – 2025. – Т. 9, № 2. – С. 89-99. – doi: 10.25298/2616-5546-2025-9-2-89-99.

ОПЫТ ДИСТАЛЬНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ПРИ ПАТОЛОГИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Латутина Е. А.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Белюк К. С.

Актуальность. За последние годы количество резекций поджелудочной железы сильно увеличилось, что прежде всего связано с большой распространенностью и увеличивающейся заболеваемостью патологий поджелудочной железы, в особенности её дистального отдела. Дистальная резекция поджелудочной железы составляет около трети всех резекций поджелудочной железы. На сегодняшний день среди англоязычных источников представлено более 300 работ о лапароскопической дистальной резекции (ЛДР) поджелудочной железы, однако лишь 6% из них включают более 30 наблюдений [1-2].

Цель. Улучшить результаты лечения патологии дистального отдела поджелудочной железы на основании демонстрации и оценки собственных наблюдений.

Методы исследования. На базе УЗ «Гродненская университетская клиника» за период с 2018 по 2024 год 12 пациентам была выполнена дистальная резекция поджелудочной железы через лапароскопический и лапаротомный доступ. Количество мужчин составило 2, количество женщин – 10. Средний возраст оперированных составил $63,5 \pm 5,9$ лет. По данным инструментальных методов исследования у всех 12 пациентов были выявлены кистозные образования тела и хвоста поджелудочной железы. Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией через лапаротомный доступ была проведена 5 пациентам. Ещё 5 пациентам была выполнена ЛДР поджелудочной железы со спленэктомией. Из них в 2 случаях была выполнена радикальная антеградная модульная панкреатоспленэктомия, предполагая возможный злокачественный генез заболевания. Двум оставшимся пациентам была проведена операция Кимура через лапаротомный и лапароскопический доступы.