

ЛИТЕРАТУРА

1. Goff, D. C. The pharmacologic treatment of schizophrenia / D. C. Goff // JAMA Network Open. – 2021. – Vol. 325, № 2. – P. 175-176. – doi: 10.1001/jama.2020.19048.
2. Малин, Д. И. Современный взгляд на эффективность электросудорожной терапии в лечении больных шизофренией / Д. И. Малин // Современная терапия психических расстройств. – 2024. – № 2. – С. 14-21. – doi: 10.21265/PSYPH.2024.31.31.002.

СТИЛЬ ПРИВЯЗАННОСТИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Лебедевская А. А.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: Филипович В. И.

Актуальность. Студенты первого курса сталкиваются с вызовами адаптации к обучению в университете. Студенты попадают в новую академическую среду, в новые условия социальных отношений. Невозможность спрогнозировать все изменения социальной среды актуализирует способность психики выдерживать неопределенность, а новые социальные связи подвергают проверке уже сложившиеся способы выстраивать межличностные отношения. Сложности в межличностных отношениях и низкая толерантность к неопределенности могут препятствовать успешной адаптации к новым условиям обучения, к сложностям медицинской профессии в целом.

Цель. Изучить взаимосвязь стиля привязанности и толерантности к неопределенности у студентов медицинского университета.

Методы исследования. Методики: опросник «Шкалы взаимоотношения» (адаптация Т.Л. Крюковой, 2019), опросник «Новый опросник толерантности к неопределенности» (автор Т.В. Корнилова, 2009) [1]. Выборка: 51 студент Гродненского государственного медицинского университета 1 курса медико-психологического факультета. Средний возраст – 17,2 года. Девушки составили 76,47%.

Результаты и их обсуждение. Получены статистически значимые взаимосвязи (корреляционный анализ Спирмена).

1. Надежный стиль привязанности и показатель МИТН ($R=-0,5$, $p<0,05$). Отрицательная взаимосвязь свидетельствует, что студенты с базовым чувством безопасности в отношениях более терпимы к непредсказуемости и сложности в межличностных отношениях.

2. Тревожный стиль привязанности и показатель МИТН ($R=0,35$, $p<0,05$). Студенты, опасющиеся утратить благорасположение других людей, нуждаются в упорядоченности и предсказуемости в межличностных взаимоотношениях.

3. Избегающий стиль привязанности и показатель ИТН ($R=0,33$, $p<0,05$). Студенты, незаинтересованные в стабильных межличностных отношениях, чувствительны к ситуациям и обстоятельствам, склонны к излишнему контролю, избеганию нового и неоднозначного, им тяжело сделать выбор.

4. Боязливый стиль привязанности и показатель МИТН ($R=0,5$, $p<0,05$). Студенты, опасаящиеся других людей, предсказуемо нетерпимы к ситуациям неопределенности в межличностных отношениях.

Выводы. Сформированный в детстве стиль привязанности к другому человеку значим в ситуации адаптации к обучению в университете, поскольку она требует доверия к новым людям, не только ориентировки в новых обстоятельствах. Студентам с ненадежными стилями привязанности (тревожный, избегающий, боязливый) в большей степени свойственно проявлять черты интолерантности к неопределенности: избегание новизны, стресс, дискомфорт в ситуациях двойственности, нетерпимость к ситуациям неопределенности в межличностных взаимоотношениях. Студенты с избегающим стилем привязанности более чувствительны к неопределенности обстоятельств, нежели отношений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Морозов, А. А. Проблема диагностики толерантности к неопределенности в Отечественной психологии / А. А. Морозов // Вестник Белорусского государственного педагогического университета. Серия 1. Педагогика. Психология. Филология. – 2025. – № 2 (124). – С. 46-50.

ЭТИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Левко М. В.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Снежицкий П. В.

Актуальность. Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) представляет собой порок развития, проявляющийся различным по глубине и форме западением грудины и передних отделов рёбер и который сопровождается функциональными нарушениями работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Это самый частый вид аномалий развития грудной клетки (90% из всех случаев врожденных пороков грудной клетки). Частота встречаемости данной патологии составляет один случай на 400–800 новорожденных, у детей в старшем возрасте ВДГК может достигать 2,4%. Мальчики страдают данной патологией в 5 раз чаще, чем девочки [1, с. 48]. У 80% детей заболевание