

Выводы. Регионарные нарушения углеводно-энергетического обмена в мозге при ОАИ определяется дозой вводимого этанола. При ОАИ средней степени отмечается более высокая скорость метаболизма глюкозы и утилизации АТФ в коре больших полушарий. При тяжелой интоксикации этанолом отмечается стабилизация углеводно-энергетического обмена в ЦНС на более низком функциональном уровне.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лелевич, С. В. Метаболические аспекты алкогольной интоксикации / С. В. Лелевич, В. В. Лелевич. – Гродно : ГрГМУ, 2024. 164 с.
2. Лелевич, В. В. Алкоголь и мозг (метаболические аспекты) / В. В. Лелевич, С. В. Лелевич, А. Г. Виницкая. – Гродно : ГрГМУ, 2019. – 244 с.
3. Лелевич, С. В. Алкоголь и углеводный обмен / С. В. Лелевич, В. В. Лелевич. – Гродно : ГрГМУ, 2018. – 140 с.

СТАТИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГРЫЖ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Лихван Д. С.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: Онощенко А. И.

Актуальность. Ежегодно в мире по поводу грыж выполняют более 20 млн хирургических вмешательств, что составляет от 10 до 15% всех проводимых операций. Пик заболеваемости наблюдается преимущественно у людей старше 50 лет [1]. Анализ статистических данных, посвященных распространенности, возрастным и половым особенностям, а также тенденциям заболеваемости грыжами является актуальным.

Цель. Проанализировать статистические данные, характеризующие распространенность, половую предрасположенность к развитию грыж.

Методы исследования. Рестриктивный анализ 116 историй болезни пациентов с грыжами, находившихся в стационаре на базе УЗ «Кобринская ЦРБ» за 2024 год.

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось в июле 2025 г. в Кобринском районе Брестской области. Результаты работы основаны на информации, полученной в ходе изучения историй болезни из архива Кобринской ЦРБ за 2024 год. Всего было исследовано 116 человек с различными формами грыж, из которых 91 мужчина (78%) и 25 женщин (22%) в возрасте от 20 до 90 лет. Среди грыж встречаются: паховые – 74 (64%), из которых косых и прямых пупочные – 16 (14%), вентральные – 18 (16%), грыжи пищеводного отверстия диафрагмы – 3 (2%), пахово-мошоночными – 3 (2%), бедренные – 1(1%), двусторонние паховая, пупочная – 1 (1%).

Из общего количества пациентов число прооперированных составило 106 (91%). В 10 случаях пациентам не проводилось оперативного вмешательства. Операции проводились как в экстренном, так и плановом порядке: экстренно – 5%, планово – 95%. Виды оперативного лечения грыж: по Лихтенштейну – 53 (50%), по Мейо – 10 (9%), по Сапежко – 5 (5%), по Шолдису – 13 (12%), по Басинни – 1 (1%), по Тарр – 3 (3%), грыжесечение по методике preperitoneal Sublay – 9 (8%), по Жирару – 1 (1%), диагностическая лапароскопия – 1 (1%), грыжесечение с пластикой грыжевых ворот сетчатым протезом – 6 (6%), грыжесечение с полипропиленовым трансплантатом – 2 (2%), лапароскопическая фундопликация – 2 (2%). Послеоперационный период в 98% случаев проходил без осложнений, в 2% случаев осложнился серомой, то есть на 116 случаев грыж пришлось 2 с вышеуказанным осложнением.

Длительность пребывания в стационаре варьировалась от одного до 15 дней. Это связано со сложностью конкретного случая, желанием пациента, наличием осложнений в послеоперационном периоде, необходимостью провести дополнительные исследования.

Выводы. Больше всего подвержены возникновению грыж мужчины старше 50 лет (59%). Наиболее распространенным видом грыж является правосторонняя паховая грыжа, а самой редкой формой оказалась двусторонняя паховая, пупочная (панталонная).

ЛИТЕРАТУРА

1. Володыкин, В. В. Вопросы патогенеза и лечения паховых грыж / В. В. Володыкин // Новости хирургии. – 2007. – № 2. – С. 112-120.

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА К ФИТОТЕРАПИИ

Лихван Н. В., Евтух В. А.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Вдовиченко В. П.

Актуальность. Фитотерапия занимает значимое место в системе профилактики и лечения заболеваний, однако её восприятие в медицинской среде остаётся неоднозначным.

Цель. Анализ отношения студентов Гродненского государственного медицинского университета (ГрГМУ) к фитотерапии, оценка уровня их информированности о лекарственных растениях, а также выявление возможных связей между образом жизни (веганство) и предпочтением натуральных методов лечения.