

КЛИНИЧЕСКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОЖИ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР ПАЦИЕНТОВ

Маликова А. С.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Лиопо Т. В.

Актуальность. В настоящее время ожирение в мире приобретает характер эпидемии. Жировая ткань, являясь метаболически активной, влияет на иммунный ответ организма и течение инфекционных заболеваний [1, 2].

Цель. Выявить особенности течения рожи у пациентов с разным индексом массы тела (ИМТ), оценить показатели гемостаза, биохимии и общеклинического анализа крови.

Методы исследования. Проанализированы 193 истории болезни пациентов, госпитализированных в УЗ «ГОИКБ» с рожей за 2023–2025 гг. Из них 179 (92,8%) человек госпитализированы впервые с этим диагнозом. Пациенты разделены на группы: с нормальной массой тела - 33 чел. (18,4%) и с избыточной массой тела/ожирением - 146 чел. (81,6%). Оценивались значения исследуемых параметров и клиническая симптоматика.

Результаты и их обсуждение. Нормальную массу тела имели 33 человека (18,4%), избыточную массу – 55 пациентов (30,7%), ожирение различных степеней диагностировано у 91 человека (50,9%).

В большинстве случаев преобладало поражение нижних конечностей (85,0%). По клиническим формам диагноза распределены следующим образом: эритематозная 176 (91,2%), эритематозно-буллезная 12 (6,2%), буллезная 3 (1,6%), буллезно-некротическая 2 (1,0%).

У пациентов с ожирением чаще повышалась температура выше 39°C – 27 случаев (17,0%) против 3 (8,8%) в группе с нормальной массой тела. Регионарный лимфаденит в группе с ожирением также встречался чаще 13 случаев (8,2%) против 1 (2,9%).

Установлено, что уровень СРБ был идентичным около $77,7 \pm 19,3$ мг/л. У пациентов с ожирением выявлена гипергликемия ($6,63 \pm 0,21$ против $5,44 \pm 0,23$ ммоль/л), что характерно для инсулинорезистентности. А так же тенденция к повышению трансаминаз: АСаТ $30,78 \pm 2,77$ Ед/л против $25,04 \pm 2,37$ Ед/л, АЛаТ $31,08 \pm 2,4$ Ед/л против $28,25 \pm 3,86$ Ед/л.

В общем анализе крови в обеих группах наблюдались типичные для бактериальной инфекции изменения: лейкоцитоз ($9,1 \pm 0,29$ против $9,08 \pm 1,07 \times 10^9$ /л) и повышение СОЭ ($25,26 \pm 1,12$ против $27,85 \pm 2,76$ мм/ч). У пациентов с ожирением отмечено некоторое снижение уровня тромбоцитов ($235,9 \pm 12,67$ против $259,3 \pm 19,23 \times 10^9$ /л) и более высокий уровень Д-димеров ($2,44 \pm 0,81$ против $1,84 \pm 0,41$ нг/мл).

Выводы. Течение рожи у пациентов с ожирением характеризуется более высокой лихорадкой, частым лимфаденитом и наличием тяжелых осложнений, что требует более интенсивной и длительной терапии. Учитывая, что 81,6% госпитализированных имеют избыточный вес, ожирение следует рассматривать как ключевой коморбидный фактор. Лабораторная картина демонстрирует выраженный воспалительный ответ и гиперкоагуляцию, что обосновывает необходимость мониторинга гемостаза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Global, regional, and national prevalence of adult overweight and obesity, 1990-2021, with forecasts to 2050: a forecasting study for the Global Burden of Disease Study 2021 / GBD 2021 Adult BMI Collaborators // Lancet. – 2025. – Vol. 405, № 10481. – P. 813-838. – doi: 10.1016/S0140-6736(25)00355-1.
2. Особенности клиники и дифференциальной диагностики рожи. Обзор / Н. Ф. Плавунов, В. А. Кадышев, Т. Я. Чернобровкина, Л. Н. Проскурина // Архивъ внутренней медицины. – 2017. – Т. 7, № 5 (37). – С. 327-339.

СТРУКТУРА И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С РОЖЕЙ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР, ЗА 2023–2025 ГОДЫ

Маликова А. С.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Лиопо Т. В.

Актуальность. Рожа остается актуальной инфекционной патологией вследствие склонности к рецидивирующему течению. В последние годы наблюдается изменение профиля пациентов: увеличивается доля лиц пожилого возраста и пациентов с метаболическими нарушениями [1]. Изучение локальных эпидемиологических данных необходимо для оптимизации лечебно-профилактических мероприятий.

Цель. Анализ возрастной структуры, антропометрических показателей и сроков госпитализации пациентов с рожей.

Методы исследования. Проведен анализ 193 историй болезни пациентов с рожей за 2023–2025 гг. Из них 179 (92,8%) человек госпитализированы впервые с этим диагнозом, 14 пациентов (7,2%) имели рецидивирующее течение. Изучались пол, возраст, индекс массы тела (ИМТ), сроки обращения за медицинской помощью.

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных отмечено незначительное преобладание женщин: 94 (52,5%) против 85 мужчин (47,5%). Средний возраст пациентов составил $62 \pm 1,12$ года, при этом женщины были старше ($66 \pm 1,45$ лет), чем мужчины ($58 \pm 1,64$ лет). Возрастной диапазон