

АРТ-ТЕРАПИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА: ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Мойсейчик А. С.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бойко С. Л.,
канд. псих. наук, доц. Воронко Е. В.,

Актуальность. Арт-терапевтический подход зарекомендовал себя как эффективный инструмент социально-психологической реабилитации, в том числе в условиях психиатрического стационара. Многообразие методов арт-терапии (изотерапия, песочная терапия, сказкотерапия и др.) открывает широкие возможности для индивидуализации лечебного процесса. Владение данным инструментарием становится важной компетенцией будущего специалиста в области психиатрии и психотерапии. [1]

Цель. Оценить уровень осведомленности студентов медико-психологического факультета (МПФ) о различных методах арт-терапии, а также изучить их субъективные представления о перспективности применения конкретных арт-терапевтических техник в будущей профессиональной деятельности.

Методы исследования. Исследование проводилось методом анкетирования с последующей математико-статистической обработкой данных. Выборку составили 100 студентов МПФ (5 и 6 курсы), из них 85 девушек и 15 юношей. Разработанная анкета включала вопросы на выявление информированности о 14 методах арт-терапии и оценку их эффективности.

Результаты и их обсуждение. Анализ данных показал, что лишь 39% респондентов имеют глубокие знания о сути и целях арт-терапии. Половина опрошенных (50%) знакома с данным направлением лишь поверхностно, а 10% затруднились с ответом. Основным источником информации для студентов выступают лекционные и семинарские занятия в университете. При этом 29% респондентов уже имеют опыт практического применения методов, а 34% обращались к дополнительным курсам и вебинарам.

Наблюдается значительная дифференциация в осведомленности о конкретных техниках. Наиболее информированы студенты о классических рисуночных методиках (рисунок человека, семьи, несуществующего животного, «Дом-дерево-человек»), свободном рисовании и песочной терапии (в среднем 45%). Напротив, о таких методах как коллажирование, лепка, маскотерапия, монотипия, фототерапия и направленная визуализация знают в общих чертах или не знают вовсе 81,4% опрошенных.

Наиболее перспективными для будущей работы респонденты считают свободное рисование, рисунок семьи, песочную терапию и сказкотерапию (44,4%).

Несмотря на выявленные пробелы в знаниях, подавляющее большинство студентов (77%) признают важность арт-терапевтических компетенций в структуре подготовки специалиста. Лишь 19% считают эти знания необязательными.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о наличии у студентов базового интереса к арт-терапии и понимания ее значимости для профессии. Однако выявленный разрыв между признанием важности направления и низкой осведомленностью о многих конкретных техниках указывает на необходимость обогащения образовательных программ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Юсупова, Е. О. Опыт применения арт-терапии в работе с психиатрическими пациентами / Е. О. Юсупова // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. – 2018. – Т. 6, № 1. – С. 89-105.

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Мойсеянчик К. А.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Колоцей В. Н.

Актуальность. Желчнокаменная кишечная непроходимость встречается достаточно редко и составляет 0,3-2,1% от всех случаев острой кишечной непроходимости. Причиной образования такого свища является длительное многолетнее нахождение крупного конкремента в желчном пузыре [1].

Цель. Целью работы является изучение особенностей диагностики и лечения желчнокаменной кишечной непроходимости.

Методы исследования. В данное исследование включены результаты обследования и хирургического лечения 8 пациентов с желчнокаменной кишечной непроходимости, находившиеся на лечении в хирургическом отделении УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» в 2012-2024 годах. Во всех случаях это были женщины в возрасте от 57 до 91 года. Все пациенты были обследованы в соответствии клиническим протоколом «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с острой кишечной непроходимостью в стационарных условиях», утвержденным Постановлением МЗ РБ 30.11.2023 №182.

Результаты и их обсуждение. Все пациентки поступили в экстренном порядке. Все указывали на наличие ЖКБ в анамнезе. У всех пациенток имелась атрибутика постепенно развивающейся кишечной непроходимости (схваткообразные абдоминальные боли, рвота, задержка стула и газов,