

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ О ПРОФИЛАКТИКЕ ВПЧ: ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Овсяник А. В., Смурага Д. Д.

Белорусский государственный медицинский университет
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Мороз И. Н.

Актуальность. Рак шейки матки, в подавляющем большинстве случаев вызванный ВПЧ, остается серьезнейшей проблемой для сохранения репродуктивной функции, однако именно для будущих врачей ключевым фактором становится не просто знание факта, а опора на доказательные источники информации при изучении этой темы [1, с. 2].

Цель. Выявить основные источники получения информации о медицинской профилактике ВПЧ и оценить уровень информированности студентов различных факультетов Белорусского государственного медицинского университета.

Методы исследования. При проведении исследования использовались социологический (анкетирование) и статистический методы. Была разработана анкета, включающая вопросы о медицинской профилактике инфекции ВПЧ среди населения. Анкетирование осуществлялось с использованием Google Формы. Объем исследования составил 336 респондентов.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что основными источниками получения информации о медицинской профилактике инфекции ВПЧ были: медиа-источники (45,8%), занятия в университете (26,8%), знакомые (13,1%), совет врача (8,3%). Отмечаются статистически значимые различия по источнику получения информации о медицинской профилактике инфекции ВПЧ среди студентов различных факультетов ($\chi^2=57,65$, $p=0,0001$). Основными источниками получения информации о медицинской профилактике инфекции ВПЧ у респондентов лечебного факультета были: медиа-источники (46,2%), занятия в университете (28,3%), знакомые (14,5%), совет врача (11,0%). Более половины (56,7%) студентов педиатрического факультета о существовании вакцины узнали на занятиях в университете, 33,3% – из медиа-источников, 6,7% – от знакомых, 3,3% – от врача. Среди студентов медико-профилактического факультета основными источника информации были: занятия в университете (56,8%), медиа-источники (32,4%), знакомые (10,8%). Почти половина студентов стоматологического факультета (45,9%) узнали о существовании вакцины через медиа-источники, 27% студентов от знакомых, 16,2% – на занятиях в университете, 10,8% – от врача. Основными источниками получения информации о медицинской профилактике инфекции ВПЧ у респондентов фармацевтического факультета были медиа-источники (67,8%), знакомые (17,2%), совет врача (8,0%), занятия в университете (6,9%).

Выводы. Основными источниками получения информации о медицинской профилактике ВПЧ для большинства студентов лечебного, фармацевтического и стоматологического факультетов были медиа-источники; для студентов педиатрического и медико-профилактического – занятия в университете.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jouya, S. Cervical Cancer Epidemiology: Global Incidence, Mortality, Survival, Risk Factors, and Equity in HPV Screening and Vaccination / S. Jouya, Z. Shahabinia, A. Mazidimoradi [et al.] // Journal of Clinical Medicine. – 2026. – Vol. 15, № 3. – P. 1079. – DOI: 10.3390/jcm15031079.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ РИСКА И КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Овсяник А. В.

Белорусский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Жуковская С. В.

Актуальность. Высокая распространенность преждевременных родов (ПР) и сопряженные с ними серьезные медико-социальные и экономические последствия обуславливают актуальность проведения исследований, направленных на решение данной проблемы. Прежде всего, это связано с широкой распространенностью данного осложнения и отсутствием динамики снижения частоты в последние несколько десятилетий [1].

Цель. Изучение общесоматического и акушерско-гинекологического анамнеза, а также особенностей течения беременности у женщин с ПР, выявление статистически значимых факторов риска ПР для разработки эффективных мер профилактики данного осложнения.

Методы исследования. На базе УЗ «1-ая городская клиническая больница» г. Минска был проведен ретроспективный анализ медицинской документации 278 родильниц. Статистическая обработка полученных данных выполнялась с использованием программ MS Office Excel 2021 и Statistica 12.0, DataTab Software.

Результаты и их обсуждение. Медиана срока родов в основной группе – 247 [237; 253] дней, в контрольной – 286 [284; 288] дней ($p < 0,05$). У родильниц основной группы отмечался статистически более высокий средний ИМТ – 27 [24,53; 32,35] кг/м², в сравнении с 21,85 [20,42; 24,9] кг/м² в группе контроля ($p < 0,05$). Осложненный акушерско-гинекологический анамнез (ОАГА) преобладал у родильниц основной группы – у 54 женщин (41%), в то время как в группе контроля он был отмечен лишь у 21 женщины (14,4%) ($\chi^2 = 24.760$; $p < 0,001$). Аномалии развития матки встречались у 5 родильниц основной группы