

Выводы. Основными источниками получения информации о медицинской профилактике ВПЧ для большинства студентов лечебного, фармацевтического и стоматологического факультетов были медиа-источники; для студентов педиатрического и медико-профилактического – занятия в университете.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jouya, S. Cervical Cancer Epidemiology: Global Incidence, Mortality, Survival, Risk Factors, and Equity in HPV Screening and Vaccination / S. Jouya, Z. Shahabinia, A. Mazidimoradi [et al.] // Journal of Clinical Medicine. – 2026. – Vol. 15, № 3. – P. 1079. – DOI: 10.3390/jcm15031079.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ РИСКА И КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Овсяник А. В.

Белорусский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Жуковская С. В.

Актуальность. Высокая распространенность преждевременных родов (ПР) и сопряженные с ними серьезные медико-социальные и экономические последствия обуславливают актуальность проведения исследований, направленных на решение данной проблемы. Прежде всего, это связано с широкой распространенностью данного осложнения и отсутствием динамики снижения частоты в последние несколько десятилетий [1].

Цель. Изучение общесоматического и акушерско-гинекологического анамнеза, а также особенностей течения беременности у женщин с ПР, выявление статистически значимых факторов риска ПР для разработки эффективных мер профилактики данного осложнения.

Методы исследования. На базе УЗ «1-ая городская клиническая больница» г. Минска был проведен ретроспективный анализ медицинской документации 278 родильниц. Статистическая обработка полученных данных выполнялась с использованием программ MS Office Excel 2021 и Statistica 12.0, DataTab Software.

Результаты и их обсуждение. Медиана срока родов в основной группе – 247 [237; 253] дней, в контрольной – 286 [284; 288] дней ($p < 0,05$). У родильниц основной группы отмечался статистически более высокий средний ИМТ – 27 [24,53; 32,35] кг/м², в сравнении с 21,85 [20,42; 24,9] кг/м² в группе контроля ($p < 0,05$). Осложненный акушерско-гинекологический анамнез (ОАГА) преобладал у родильниц основной группы – у 54 женщин (41%), в то время как в группе контроля он был отмечен лишь у 21 женщины (14,4%) ($\chi^2 = 24.760$; $p < 0,001$). Аномалии развития матки встречались у 5 родильниц основной группы

(3,78%), в группе контроля аномалий развития матки не отмечалось вовсе ($\chi^2=5.632$; $p<0,05$). Вмешательства на шейке матки в анамнезе отмечены у 14 (10,61%) женщин основной группы и лишь у 2 (1,37%) женщин контрольной группы ($\chi^2=10.903$; $p<0,001$). Инфекции во время беременности отмечены у 66 (50%) женщин основной группы, в контрольной группе у 36 (24,66%) родильниц ($\chi^2=19.167$; $p<0,001$). Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) выявлена у 21 (15,91%) родильницы основной группы, в контрольной группе у 9 (6,2%) женщин ($\chi^2=5.492$; $p<0,05$). Гипертензивные расстройства в основной группе наблюдались у 50 (37,88%) родильниц, в контрольной – у 39 (26,7%) женщин ($\chi^2=3.971$; $p<0,05$).

Выводы. Таким образом, по данным проведенного исследования основными этиологическими факторами, способствующими возникновению ПР, являются: возраст, избыточная масса тела, осложненный акушерско-гинекологический анамнез, аномалии развития матки, вмешательства на шейке матки в анамнезе, анемия и инфекции во время беременности, ИЦН, гипертензивные расстройства, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, раздельное диагностическое выскабливание/гистероскопия в анамнезе.

На основании результатов исследования разработан и внедрен в лечебную работу на базе УЗ «1-ая городская клиническая больница г. Минска», МЧУП «Центр репродуктивной медицины», г. Минск чек-лист, который позволил индивидуализировать и оптимизировать стратегию ведения беременности у женщин, относящихся к группе высокого риска реализации ПР.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ишан-Ходжаева, Ф. Р. Влияние COVID-19 на частоту преждевременных родов / Ф. Р. Ишан-Ходжаева, М. Я. Камилова, М. М. Юнусова // Медицинский вестник Национальной академии наук Таджикистана. – 2021. – № 2. – С. 72-77.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ НА ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ МЕТАДОНОВОЙ ТЕРАПИИ

Оганисян М. А.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Юречко Е. В.

Актуальность. Заместительная метадоновая терапия (ЗМТ) – основной метод реабилитации пациентов с опиоидной зависимостью. Эффективность программы определяется комплексом социально-психологических факторов, что требует их детального изучения [1].

Цель. Проанализировать социально-психологические характеристики пациентов, находящихся на ЗМТ в УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология» в период 2024–2025гг.