

BRAF-ингибиторов: Дабрафениб+Траметиниб и Танифлар+Мекинист. Меланома относится к радиорезистентным опухолям, поэтому реже в качестве лечения использовались дистанционная лучевая терапия и системная химиотерапия. На момент исследования 41 пациент продолжает наблюдение, 9 пациентов умерли от основного заболевания.

Выводы. Основным методом лечения является хирургический, при невозможности иссечения опухоли возможно использование лекарственной и лучевой терапии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Lazaroff, J. Targeted Therapy and Immunotherapy in Melanoma Immune and targeted therapies in melanoma: an overview / J. Lazaroff, D. Bolotin // Dermatol Clin. – 2023. – Vol. 41. – P. 65-77. – doi: 10.1016/j.det.2022.07.007

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДАКРИОЦИСТИТОМ

Ситько А. Д.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Хоров О. Г.

Актуальность. Дакриоцистит — воспаление слёзного мешка, обусловленное тесной связью слезоотводящих путей с полостью носа. Основные причины: заболевания слизистой носа, синуситы, травмы лица и последствия ринологических операций [1]. В Гродненской университетской клинике лечение проводится совместно оториноларингологами и офтальмологами с применением эндоскопических и лазерных технологий. Проблема сохраняет высокую актуальность для обеих специальностей [2].

Цель. Оценить характеристику пациентов с дакриоциститом, поступивших в оториноларингологическое гнойное отделение для взрослых Гродненской университетской клиники для хирургического лечения.

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации взрослых с дакриоциститом, находившихся на стационарном лечении с 2019 г. по 2026 г.

Результаты и их обсуждение. За исследуемый период было госпитализировано 54 пациента в возрасте от 24 до 86 лет (средний возраст 66 лет). При поступлении 84% пациентов отмечали жалобы на длительное слёзотечение, 16% — на припухлость и покраснение глаз. У 20% госпитализированных был выставлен диагноз острый дакриоцистит, 80% — хронический дакриоцистит. Из сопутствующих заболеваний у 15% пациентов — открытоугольная глаукома, 10% — катаракта, 5% — хронический полипозно-гнойный гайморит, у 10% пациентов в анамнезе —

полипэтмоидогайморотомия, киста верхнечелюстной пазухи, 10% – гайморотомия с септоринопластикой, 10% – хронический верхнечелюстной синусит, у 15% пациентов причиной дакриоцистита явилась открытая черепно-мозговая травма, хронический блефароконъюнктивит – у 10% пациентов.

Всем пациентам было проведено хирургическое лечение совместно с офтальмологами: 90% случаев – классическая эндоскопическая дакриоцисториностомия, 10% случаев – лазерная эндоскопическая дакриоцисториностомия. В комплексе с хирургическим лечением применялась системная и местная антибиотикотерапия [3]. Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии, рецидивы наблюдались в 4% случаев.

Выводы. Опираясь на данные, полученные в ходе ретроспективного анализа эпикризов пациентов, госпитализированным с дакриоциститом можно сделать следующие выводы. Дакриоцистит остаётся актуальной проблемой среди заболеваний ЛОР-органов. Основными жалобами у пациентов являются припухлость и покраснение глаз, слезотечение и заложенность носа. Своевременное обращение к врачу-оториноларингологу и офтальмологу на ранних стадиях заболевания, а также настороженность амбулаторного звена позволит обнаружить развитие патологического процесса на ранних стадиях и позволит избежать возникновения осложнений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Acute dacryocystitis retention: a case report and literature review / S. Aleid, S. A. Schellini, O. Alsheikh, S. M. Elkhamary // *Arq Bras Oftalmol.* – 2022. – Vol. 85, № 3. – P. 306-308. – doi: 10.5935/0004-2749.20220044.
2. Fatani, D. Dacryocystitis in a Patent Nasolacrimal Drainage System: A Literature Review / D. Fatani, A. AlSuhaibani // *Semin Ophthalmol.* – 2024. – Vol. 39, № 8. – P. 595-598. – doi: 10.1080/08820538.2024.2370829.
3. The microbiologic spectrum of dacryocystitis / B. Luo, M. Li, N. Xiang [et al.] // *BMC Ophthalmol.* – 2021. – Vol. 21, № 1. – P. 29. – doi: 10.1186/s12886-020-01792-4.

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Ситько А. Д.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: Ославская М. Ч.

Актуальность. Внегоспитальная пневмония (ВП) – одно из распространённых заболеваний в мире [1]. Лейкоцитоз, нейтрофилёз, палочкоядерный сдвиг указывают на высокую вероятность бактериальной инфекции и являются характерными биомаркерами пневмонии, т. к. ведущая