

«Шкалы оценки отношений» (С. Хенрик, 1988). Общее количество респондентов – 82 человека, из них – 63 женщины и 19 мужчин в возрасте 17–38 лет.

Результаты и их обсуждение. Были выявлены положительные корреляционные связи: уровня удовлетворенности отношениями с «фактическим Эросом» ($r=0,363$, $p=0,001$), «фактическим Сторге» ($r=0,237$, $p=0,032$) и «желаемым Агапе» ($r=0,221$, $p=0,046$); «желаемый Сторге» связан с «Манией фактической» ($r=0,262$, $p=0,018$); «фактическая Прагма» с «желаемым Агапе» ($r=0,245$, $p=0,027$); «Мания фактическая» с «фактическим» ($r=0,253$, $p=0,022$) и «Агапе желаемым» ($r=0,224$, $p=0,043$); «Лудус фактический» с «желаемым Лудусом» ($r=0,697$, $p=0,000$); «Сторге желаемый» с «фактическим» ($r=0,359$, $p=0,001$) и «желаемым Агапе» ($r=0,356$, $p=0,001$); «фактический Эрос» с «Эросом желаемым» ($r=0,548$, $p=0,000$) и «фактическим Сторге» ($r=0,220$, $p=0,047$). Были выявлены отрицательные корреляционные связи: «фактический Эрос» с «Лудусом фактическим» ($r=-0,267$, $p=0,015$); «фактическая Прагма» с «Манией фактической» ($r=-0,218$, $p=0,049$).

Выводы. Любовный стиль – это сумма определения человеком понятия «любовь» и его отношения к ней, любовных притязаний, вызывающих переживания, и непосредственно действий в сторону партнера. Удовлетворенность отношениями связана с влечением к физической близости, в том числе сексуально окрашенной, с заботой и привязанностью, основанной на надежности и безопасности, а также с безусловным принятием и любовью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сокол, А. В. Дискурс первой романтической любви: гендерные сценарии / А. В. Сокол // Интеракция. Интервью. Интерпретация. – 2021. – Т. 13, № 4. – С. 68–91.
2. Фурманов, И. А. Любовные аттитуды в романтических и супружеских отношениях / И. А. Фурманов // Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. – 2019. – № 3. – С. 74–81.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАНИМАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Станевич Ю. А.¹, Карпик В. Н.²

¹Гродненский государственный медицинский университет,

²Гродненская университетская клиника

Научный руководитель: Протасевич П. П.

Актуальность. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) является значимой медицинской и демографической проблемой современности, так как часто приводит к утрате трудоспособности, инвалидности, а при

неблагоприятном течении и летальности. Так в США ОНМК занимает 5 место в причине летальности [1].

Цель. Изучить особенности течения ОНМК у пациентов за последние 3 года, выявить тенденции.

Методы исследования. В основу ретроспективного анализа было положено изучение 507 медицинских карт стационарных пациентов, поступивших в ОАР № 3 УЗ «Гродненская университетская клиника» с ОНМК для предполагаемой тромболитической терапии в период с января 2023 года по октябрь 2025.

Все пациенты были разделены на 3 группы по годам госпитализации. Статистическую обработку полученного материала проводили с помощью лицензионной программы Statistica 10.0 (Statsoft Inc, USA). При сравнении независимых групп с отличным от нормального распределением значений одного или двух количественных признаков использовался непараметрический метод – U-критерий Манна-Уитни. Критический уровень статистической значимости принимали за $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. В 2023 году в ОАР №3 поступили 189 пациентов с подозрением на ОНМК. Средний возраст составил 62,8 (57;70). По половому признаку 29,6% женщин и 70,4% мужчин. У 10,6% пациентов в ходе выполнения компьютерной томографии был выявлен геморрагический характер поражения головного мозга, в связи с чем тромболитическая терапия не проводилась. Средняя продолжительность терапии в ОАР составила 3[1;5] дня. Летальность была 14,3%.

В 2024 году было пролечено 184 пациента, 39,1% женщин и 61,9% мужчин. Средний возраст был 63,4 [55,5;73]. Геморрагический характер патологии имели 13,6% пациентов. Средняя продолжительность пребывания в ОАР составила 3[1;4] дня. Летальность была 11,9%.

За 9 месяцев 2025 года было пролечено 134 пациента, 27,6% женщин и 72,4% мужчин. Средний возраст был 61,8 [55;72]. Геморрагический характер патологии имели 12,7% пациентов. Средняя продолжительность пребывания в ОАР составила 2 [1;4] дня. Летальность была 11,2%.

Выводы. Общие характеристики пациентов, количество пролеченных, возраст, половая принадлежность сопоставимы по годам. Летальность остается довольно высокой с некоторой тенденцией на уменьшение. Также намечается тенденция к интенсификации интенсивной терапии в реанимационном стационаре и, соответственно, к уменьшению реанимационного койко-дня. Результаты получены на малой выборке и требуют дальнейшего, углубленного исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bogenschutz, K. M. Acute ischemic stroke: a guideline-based overview of evaluation and management / K. M. Bogenschutz, D. S. Fisher, G. W. Wright // JAAPA. – 2025. – Vol. 38, № 5. – P. 13–20.