

являются грозным осложнением и требуют своевременной диагностики. Раннее обнаружение амёбных кист печени дало бы возможность избежать их абсцедирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Войно-Ясенецкий, В. Ф. Очерки гнойной хирургии / В. Ф. Войно-Ясенецкий. – 4-е изд. – Москва : БИНОМ, 2021. – 720 с.
2. Хирургическое лечение внекишечного амебиаза с развитием абсцесса правой доли печени / К. С. Белюк, Р. С. Шило, О. С. Сорока [и др.] // Гепатология и гастроэнтерология. – 2023. – Т. 7, № 2. – С. 156–162. – doi: 10.25298/2616-5546-2023-7-2-156-162.

АНАЛИЗ СТИЛЕЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРОСНИКА «АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ» Э. Г. ЭЙДЕМИЛЛЕРА, В. В. ЮСТИЦКИСА

Стемпковская Л. В.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: Чебан В. С.

Актуальность. В современной психологической практике консультирования семьи и детско-родительских отношений все более очевидным становится факт: проблемное поведение ребенка, его эмоциональные трудности и школьная дезадаптация крайне редко являются изолированными феноменами. Как правило, они выступают симптомами более глубинного процесса – дисгармонии в системе семейного воспитания. В связи с этим, одним из важнейших этапов консультативной работы становится первичная диагностика, направленная не столько на «измерение» проблем ребенка, сколько на анализ родительского отношения и структуры семейного воспитания.

Наиболее валидным и широко признанным инструментом для решения этой задачи в отечественной психологии является опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ), разработанный Э. Г. Эйдемиллером и В. В. Юстицкисом.

Цель. Анализ результатов диагностики стилей семейного воспитания с помощью опросника АСВ, а также демонстрация значимости этого этапа для последующего консультирования.

Методы исследования. Методика Эйдемиллера Э. Г. и Юстицкиса В. В. «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) позволяет определить, *каким образом родители воспитывают ребенка* в семье [1, с. 42; 2, с. 37].

Результаты и их обсуждение.

1. Гармоничный стиль воспитания выявлен у 7 родителей (25,9%).

2. Отклонения диагностированы у 20 родителей (74,1%). При этом наиболее частыми оказались следующие типы отклонений: недостаточность требований-запретов (З-) – 11 случаев (40,7%); минимальность санкций (С-) – 10 случаев (37%); предпочтение женских качеств (ПЖК) – 6 случаев (22,2%).

3. Типы воспитания распределились следующим образом: либерально-попустительский (включая вариант с феминизацией) – 11 случаев (40,7%); инфантилизирующий – 3 случая (11,1%); противоречивый (гиперопека + попустительство) – 3 случая (11,1%); повышенная моральная ответственность – 2 случая (7,4%); тревожно-опекающий – 1 случай (3,7%).

Выводы. В исследованной выборке преобладает мягкий, низкоконтрольный стиль воспитания с элементами инфантилизации и гендерной стереотипизации. Наиболее уязвимыми зонами являются несформированность системы запретов и последствий, тенденция к замедлению сепарации ребёнка, воспроизводство традиционных гендерных моделей. Доминирование либерально-попустительского стиля указывает на тенденцию к слабой структурированности воспитательной среды: родители избегают запретов и наказаний, что может приводить к недостатку внутренних границ у детей. Гармоничные случаи (25,9%) демонстрируют, что каждый четвертый родитель в выборке применяет сбалансированный, адаптивный стиль воспитания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 672 с. – (Мастера психологии).
2. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 656 с. – (Золотой фонд психотерапии).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ КАК МЕТОДА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ

Стойлик Н. И.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Леднева И. О.

Актуальность. Определение этиологии внебольничных пневмоний (ВП) остается серьезной проблемой, поскольку признаки, симптомы и рентгенологические особенности пневмоний, вызванных различными этиологическими агентами, значительно совпадают [1]. В связи с этим существует потребность в поиске надежных лабораторных методов для диагностики ВП.