

близости. Выявлена двухкомпонентная структура готовности, сочетающая эмоциональную зрелость и практическую ориентированность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Голод, С. И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты / С. И. Голод. – Ленинград : Наука, 1984. – 136 с.

СЛОВО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Трусь С. С.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: Езепчик О. А.

Актуальность. Наше государство активно борется за культуру общения, поддерживают различные инициативы. Согласно законодательству РБ, употребление нецензурной брани в общественном месте относится к административному правонарушению.

Цель. Изучить литературные источники по теме вреда для здоровья употребления нецензурных слов, выяснить отношение к исследуемой теме молодых людей.

Методы исследования. Анализ литературных источников; анонимное анкетирование 65 студентов 17–22 лет.

Результаты и их обсуждение. Эмоциональные переживания могут изменять поведение человека, его речь и побуждения [1; 3]. Описано неблагоприятное воздействие ругательств на тех, кто их услышал и тех, кто их произносил [1]. Результаты исследований к.б.н. Горяева П.П. и к.т.н. Тертышного Т.Г. продемонстрировали мутагенный эффект у человека, который употребляет или слышит бранные слова ежедневно. ДНК вырабатывает противоестественные программы самоликвидации [2, с. 66]. Матерные слова способствуют выработке андрогенов и провоцируют гормональные нарушения у женщин не только когда «выражаются» они, но и когда говорят в их присутствии нецензурные слова. Особенно опасны сексуально-скабрёзные ругательства для подростков, для их психики в период становления [3]. Регулярное употребление нецензурной лексики может свидетельствовать о скрытых или надвигающихся психосексуальных проблемах [2, с. 64]. Результаты анкетирования. На вопрос о причинах применения в речи мата и ругательств больше 75% респондентов ответили, чтобы выразить злобу или для связки слов. О влиянии употребления нецензурной брани на здоровье, студенты ответили: 70.8% – никак не влияют, 7.7% – оказывают мутагенный эффект. Большинство опрошенных студентов (89.9%) знают, что употребление нецензурной брани в общественном месте наказывается по закону РБ. Около 40% респондентов не хотят, чтобы их будущие дети в своей речи использовали нецензурную брань. Анкетирование

продемонстрировало сложность решения вопроса о том, что нужно сделать, чтобы люди не употребляли бранных слов. Высказали следующие мнения: повышать общую культуру людей, уделять больше внимания воспитанию, больше читать, контролировать свою речь, менять окружение, расширять словарный запас. Однако, многие скептически отнеслись к этому вопросу.

Выводы. Отказаться от употребления ненормативной лексики следует по нескольким причинам. Это нарушение закона и вред здоровью, портит репутацию человека и создаёт негативную атмосферу. Работа против сквернословия способствует развитию духовных и нравственных ценностей. Результаты анкетирования показали осведомлённость о требованиях законодательства, недостаточную оценку вреда нецензурной брани и актуальность вопроса улучшения культуры речи молодых людей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Духанина, И. А. Вклад Л. А. Китаева-Смыка в разработку отечественной психологии стресса / И. А. Духанина // ELiS | ПГНИУ : [сайт]. – URL: <https://elis.psu.ru/node/642403> (дата обращения: 26.02.2026).
2. Резник, И. И. Сквернословие – славянская традиция или беда народа? / И. И. Резник // Национальные приоритеты России. – 2023. – № 2 (49). – С. 63–68.
3. Китаев-Смык, Л. А. Психофизиологические и социально-психологические аспекты сексуальных инвектив и «матерной речи» / Л. А. Китаев-Смык // Психологическая газета. – 18.05.2021. – URL: <https://psy.su> (дата обращения: 26.02.2026).

ТЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ

Уколова К. В.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Заборовский Г. И.

Актуальность. Преждевременные роды (ПР) в современном акушерстве являются актуальной проблемой. Ежегодно во всем мире приблизительно 15 млн детей рождаются недоношенными, что составляет около 11% всех родов в мире [1]. Поскольку этиология ПР не совсем ясна, идентификация факторов риска и определение индивидуального риска, своевременная диагностика, ранее начало профилактических мероприятия имеют важное значение в ведении беременных женщин [1].

Цель. Изучить особенности течения первичной и вторичной беременности и родов, произошедших преждевременно.

Методы исследования. Исследование основано на анализе выкопированных сведений из медицинской документации. Изучены материалы о 55 пациентках с преждевременными родами.