

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

Шепелевич Ю. А.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: Ситько И. М.

Актуальность. В рамках календаря проводится плановая иммунизация против 13 инфекционных заболеваний, по эпидемическим показаниям – против 21 инфекции. Недоверие к вакцинации – сложное и противоречивое явление, связанное не только с медицинскими факторами, но и с социальными, психологическими, религиозными и другими составляющими современной жизни, поэтому требует всестороннего изучения [1].

Цель. Изучить осведомленность родителей об иммунопрофилактике и их отношение к вакцинации детей.

Методы исследования. Проведено анонимное анкетирование 84 родителей в г. Брест через Google-формы. Анкета из 14 вопросов оценивала социально-демографические характеристики, информированность о вакцинации и отношение к ней. Среди респондентов 33,4% младше 35 лет, 66,6% старше; высшее образование у 48,8%, среднее и средне-специальное у 51,2%; 42,9% воспитывают троих детей, по 28,6% – одного или двоих.

Результаты и их обсуждение. 70,2% респондентов заявили о положительном отношении к вакцинации. Оценка эффективности прививок по пятибалльной шкале: 16,9% – «5», 65,1% «4». Фактическая приверженность вакцинации: у 81,9% опрошенных дети привиты своевременно и в полном объеме, 8,4% никогда не прививали ребенка. 54,3% родителей сделали выбор в пользу вакцинации, так как доверяют рекомендациям врача, 42% верят в эффективность вакцинации. Среди причин отказа или задержки вакцинации 68,7% указали на наличие медицинских противопоказаний, боязнь побочных эффектов 26,9%, отрицательный опыт вакцинации 9%, недостаток информации о прививке 7,5%. Не испытывают никаких опасений относительно прививок 57,3%, опасаются побочных эффектов 26,9%, 11% – опасных компонентов вакцин, 22,0% считают, что прививки ослабляют иммунитет, 9,8% – провоцируют аутизм. Информированность респондентов о Календаре профпрививок: 31% хорошо знают, 53,6% знакомы с ним лишь частично, не знают о существовании 15,5%. Осведомленность по инфекциям: знают о вакцинации против столбняка 92,3%, кори 91,0%, коклюша 85,9%, эпидемического паротита 42,3%, пневмококковой инфекции 50,0%, краснухи 66,7%. В вопросе об источнике информации о вакцинации 94% указали медицинских работников, интернет 28,6%. О влиянии просветительной работы на отношение к вакцинации 61,1% отметили изменения в пользу вакцинации, 5,6% (1 человек) – «сомнения относительно целесообразности прививок

усилились». Для получения информации о вакцинации 91,7% респондентов предпочли медработников, 22,6% интернет-ресурсы, 13,1% СМИ.

Выводы. Выявлена высокая приверженность вакцинации, сформированная преимущественно под влиянием медработников. Основные риски обусловлены недостаточной информированностью о Календаре прививок и сомнениями в безопасности вакцин. Сохраняется актуальность просветительской работы по вопросам иммунопрофилактики как со стороны медработников, так и в цифровом пространстве.

ЛИТЕРАТУРА

1. Преодоление «антипрививочного скепсиса»: поиски решения выхода из сложившейся ситуации / Т. А. Калюжная, М. В. Федосеенко, Л. С. Намазова-Баранова [и др.] // Педиатрическая фармакология. – 2018. – Т. 15, № 2. – С. 141–148. – doi: 10.15690/pf.v15i2.1871.

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЛАТЕНТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ВЗРОСЛЫХ ИЗ ГРУПП РИСКА

Шидловская А. С., Жуковская К. Г., Маркевич Я. З.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Демидик С. Н.

Актуальность. Латентная туберкулезная инфекция (ЛТБИ) – состояние стойкого иммунного ответа, вызванного присутствием в организме антигенов *Mycobacterium tuberculosis*, при отсутствии клинических проявлений активного туберкулеза (ТБ). Систематический скрининг ЛТБИ позволяет предотвратить развитие активного ТБ [1].

Цель. Провести оценку распространенности ЛТБИ в отдельных группах риска.

Методы исследования. Объект исследования – 464 взрослых пациента. Из них: 137 с ревматоидным артритом, направленных в поликлиническое отделения Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия», перед назначением биологической терапии; 327 с хроническими психическими заболеваниями из психоневрологического дома-интерната. Средний возраст обследованных составил $56,8 \pm 12,3$ лет. Для диагностики ЛТБИ проводилась проба Манту и Диаскинтест (ДТ).

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у 123 (89,8%) пациентов с ревматоидным артритом ответная реакция на ДТ была отрицательная. Сомнительная реакция выявлена у 3 (2,2%) пациентов. Положительная реакция отмечена в 11 (8%) случаях, из них: гиперергическая – у 6 (54,5%), выраженная – у 3 (27,3%) и умеренно выраженная – у 1 (18,2%) [2]. У пациентов с хроническими психическими заболеваниями из дома-интерната на 1-м этапе