

усилились». Для получения информации о вакцинации 91,7% респондентов предпочли медработников, 22,6% интернет-ресурсы, 13,1% СМИ.

Выводы. Выявлена высокая приверженность вакцинации, сформированная преимущественно под влиянием медработников. Основные риски обусловлены недостаточной информированностью о Календаре прививок и сомнениями в безопасности вакцин. Сохраняется актуальность просветительской работы по вопросам иммунопрофилактики как со стороны медработников, так и в цифровом пространстве.

ЛИТЕРАТУРА

1. Преодоление «антипрививочного скепсиса»: поиски решения выхода из сложившейся ситуации / Т. А. Калюжная, М. В. Федосеенко, Л. С. Намазова-Баранова [и др.] // Педиатрическая фармакология. – 2018. – Т. 15, № 2. – С. 141–148. – doi: 10.15690/pf.v15i2.1871.

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЛАТЕНТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ВЗРОСЛЫХ ИЗ ГРУПП РИСКА

Шидловская А. С., Жуковская К. Г., Маркевич Я. З.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Демидик С. Н.

Актуальность. Латентная туберкулезная инфекция (ЛТБИ) – состояние стойкого иммунного ответа, вызванного присутствием в организме антигенов *Mycobacterium tuberculosis*, при отсутствии клинических проявлений активного туберкулеза (ТБ). Систематический скрининг ЛТБИ позволяет предотвратить развитие активного ТБ [1].

Цель. Провести оценку распространенности ЛТБИ в отдельных группах риска.

Методы исследования. Объект исследования – 464 взрослых пациента. Из них: 137 с ревматоидным артритом, направленных в поликлиническое отделения Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия», перед назначением биологической терапии; 327 с хроническими психическими заболеваниями из психоневрологического дома-интерната. Средний возраст обследованных составил $56,8 \pm 12,3$ лет. Для диагностики ЛТБИ проводилась проба Манту и Диаскинтест (ДТ).

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у 123 (89,8%) пациентов с ревматоидным артритом ответная реакция на ДТ была отрицательная. Сомнительная реакция выявлена у 3 (2,2%) пациентов. Положительная реакция отмечена в 11 (8%) случаях, из них: гиперергическая – у 6 (54,5%), выраженная – у 3 (27,3%) и умеренно выраженная – у 1 (18,2%) [2]. У пациентов с хроническими психическими заболеваниями из дома-интерната на 1-м этапе

проводилась проба Манту. При оценке отмечено, что отрицательная реакция наблюдалась у 222 (67,9%) человек, сомнительная – у 4 (1,2%), слабоположительная и положительная средней интенсивности (папула 5–14 мм) – у 84 (25,7%), выраженная положительная реакция – 17 (5,2%). На 2-м этапе для проведения ДТ отобрано 17 человек с выраженной положительной реакцией на Пробу Манту. Установлено, что у 7 (41,2%) пациентов ответная реакция на ДТ была отрицательная. Сомнительная реакция выявлена в 3 (17,6%) случаях. Отмечено, что положительная гиперергическая реакция на ДТ была у 7 (41,2%).

Выводы. Диагностика ЛТБИ является актуальным и насущным вопросом современной фтизиатрии. ДТ является тестом выбора для диагностики ЛТБИ у взрослых пациентов с факторами риска, учитывая его высокую специфичность и чувствительность. По данным исследования показано, что распространенность ЛТБИ с гиперергической реакцией на ДТ составила 4,4% среди пациентов с ревматоидным артритом и 2,1% в группе пациентов психоневрологического дома-интерната. Данной категории пациентов в течение 1 года показано наблюдение фтизиатром (группа диспансерного наблюдения VIB).

ЛИТЕРАТУРА

1. Диагностика и лечение пациентов с туберкулезом (взрослое, детское население) : клинический протокол : утв. постановлением М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 16 дек. 2022 г. № 118. – URL: https://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/CProtokol/16.12.2022_118.pdf (дата обращения: 17.10.2025).
2. Использование диаскинтеста для диагностики латентной туберкулезной инфекции у взрослых перед назначением биологической терапии / С. Н. Демидик, Е. Н. Алексюк, С. С. Декевич, Г. Ч. Дюрдь // Актуальные проблемы медицины : сборник материалов итоговой научно-практической конференции, 25-26 января 2024 г. / Гродненский государственный медицинский университет ; редкол.: И. Г. Жук (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2024. – С. 132-134. – 1 CD-ROM.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В НОСИМЫХ УСТРОЙСТВАХ

Шидловский А. С.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Смирнов В. Ю.

Актуальность. Артериальное давление (АД) относится к числу важнейших физиологических показателей, определяющих общий риск развития заболеваний системы кровообращения. Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, при этом гипертония часто называется «тихим убийцей». Классическая методика измерения остаётся