

Результаты получены на малой выборке и требуют дальнейшего, углубленного исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bogenschutz, K. M. Acute ischemic stroke: a guideline-based overview of evaluation and management / K. M. Bogenschutz, D. S. Fisher, G. W. Wright // JAAPA. – 2025. – Vol. 38, № 5. – P. 13–20.
2. Организация помощи пациентам с инсультом в России. Итоги 10 лет реализации комплекса мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения / В. И. Скворцова, И. М. Шетова, Е. П. Какорина [и др.] // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. – 2018. – Т. 12, № 3. – С. 5–12.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН

Яковишина Е. А.

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель: канд. мед. наук., доц. Савоневич Е. Л.

Актуальность. В результате крупных эпидемиологических исследований доказано, что одним из важнейших факторов развития рака у женщин является инфицирование высокоонкогенным вирусом папилломы человека (ВПЧ). ВПЧ-ассоциированная патология как шейки матки, так и ротоглотки у женщин, чаще всего обусловлена наличием 16 типа ВПЧ, который передается преимущественно орально-генитальным путем. В последние годы заболеваемость ВПЧ-ассоциированными формами рака демонстрирует устойчивый рост. Вместе с тем, эти формы рака могут быть потенциально предотвратимы с помощью вакцинации. Перекрестная защита против других локализаций ВПЧ-ассоциированных раков, объясняет исключительную пользу проведения вакцинации в группе подростков и позволяет рассматривать ее как реальный путь борьбы с раком. Однако, многие исследователи отмечают, что для индукции опухолевого роста одного только инфицирования ВПЧ недостаточно, и указывают на роль других факторов в ВПЧ-индуцированном канцерогенезе. В настоящее время патогенез большинства онкологических заболеваний у женщин рассматривают в неразрывной связи с эндокринной функцией репродуктивной системы. Это определяет актуальность изучения и сопоставления клинимо-морфологических данных пациенток с особенностями их эндокринного статуса [1].

Цель. Оценить факторы риска ВПЧ-индуцированного канцерогенеза и частоту ассоциации ВПЧ-ассоциированных заболеваний ротоглотки у женщин с дисплазией и раком шейки матки.

Методы исследования. Нами проведен проспективный анализ состояния здоровья 52 женщин с дисплазией HSIL и раком шейки матки, которые

проходили стационарное лечение в онкологическом отделении №3 Гродненской университетской клиники в 2025-2026гг. Проведено анкетирование женщин, анализ клинических и анамнестических данных, результатов цитологического и гистологического исследований. 38 из 52 пациенток были профилактически осмотрены врачом отоларингологом.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 36 лет. Нарушения жирового обмена имели место у 11 пациенток (21%), сахарным диабетом 2 типа болела 1 женщина, еще у 4 был диагностирован гипотиреоз. У большинства женщин менструальный цикл был регулярным (88%), менархе было в 12-13 лет (83%). Каждая третья женщина начала половую жизнь в возрасте до 18 лет. Беременности и роды были в анамнезе у 72% пациенток. При изучении семейного онкоанамнеза установлено наличие онкопатологии у кровных родственников 35 из 52 женщин. Никотиновая зависимость была отмечена в 18 случаях. Развитие рака или дисплазии HSIL в шейке матки свидетельствует о высокой вирусной нагрузке и длительной персистенции ВПЧ-инфекции. Вместе с тем большинство пациенток отрицало наличие жалоб и патологических цитологических мазков при регулярном наблюдении у врача гинеколога по месту жительства. ВПЧ 16 типа был наиболее часто встречающимся типом у пациенток. По результатам морфологического исследования конизации шейки матки дисплазия шейки матки 2 степени была установлена у 12 женщин, дисплазия шейки матки 3 степени – у 37, плоскоклеточная карцинома шейки матки in situ или микроинвазивная – у 3. У всех осмотренных пациенток патологических изменений в ротоглотки не выявлено.

Выводы. У женщин с дисплазией/раком шейки матки не установлено иных значимых факторов риска и клинических проявлений ВПЧ-инфекции в ротовой полости.

ЛИТЕРАТУРА

1. Папилломавирусная инфекция: диагностика, лечение и профилактика / В. Н. Прилепская, С. И. Роговская, Н. И. Кондриков, Г. Т. Сухих. – Москва : МЕДпресс-информ, 2007. – 240 с.

ПРИМЕНЕНИЕ PRP-ТЕРАПИИ В ХИРУРГИИ

Якубюк С. П.

Волковысская центральная районная больница

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Иоскевич Н. Н.

Актуальность. Актуальность исследования связана с повышением интереса к применению данного метода лечения в клинической практике.

Цель. Проанализировать современные возможности применения PRP-терапии в хирургии.