

2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). – Ф. Р-7021. Оп. 81. Д. 102. Л. 166-168.

3. Абрамович, Л. И. Пустота Слонима / Л. И. Абрамович. – Минск, 2013. – 100 с.

4. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). – Ф. 1363. Оп. 1. Д. 1108. Л. 9-11,13.

АМПУТАЦИЯ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945

Слабодчиков З.В.

Гродненский государственный медицинский университет
г. Гродно, Республика Беларусь

Научный руководитель – подполковник м/с Князев И.Н.

Актуальность. Ампутация является крайне радикальным методом лечения, когда выбор стоит между сохранением конечности и спасением жизни пациента. Проведенное исследование поможет изучить данный вид операции как, зачастую, единственный способ спасения жизни раненых в период Великой Отечественной войны.

Цель. Целью исследования является изучение необходимости ампутации конечностей в военно-полевой хирургии как наиболее эффективно способа спасения жизни пострадавшим.

Методы исследования. Выполнен обзор данных, опубликованных в научной литературе, посвященных организации и развитию военно-полевой хирургии в годы Великой Отечественной войны, с использованием исторического, а также общенаучных методов исследования. Проанализировано 15 научных источников, содержащих анализ клинических наблюдений, методических рекомендаций, приказов медицинской службы, а также обобщающие труды военно-полевых хирургов того времени.

Результаты и их обсуждение. В период Великой Отечественной войны ампутация конечностей являлась не только широко применяемой хирургической процедурой, но и в ряде случаев единственным способом сохранения жизни тяжело раненых солдат. Огромное количество боевых травм, полученных в ходе боевых действий, приходилось на конечности, преимущественно нижние. Ранения отличались высокой степенью тяжести и часто сопровождалась сочетанием множественных осколочных переломов, обширных размозжений мягких тканей и повреждений магистральных сосудов с вовлечением полимикробной флоры в патологический процесс [1, с. 186]. В таких ситуациях медицинская эвакуация на госпитальный

уровень и качественная хирургическая помощь, особенно в начале войны, когда организация медицинской службы не была завершена [2, с. 193], могли быть затруднены, что делало своевременное принятие решения об ампутации особенно критичным.

Пулевые и осколочные ранения осложнялись гнойной инфекцией. При своевременной хирургической обработке наблюдалось выздоровление, однако при отсутствии своевременно оказанной помощи наблюдалось вовлечение в патологический процесс все большее количество тканей с генерализацией инфекционного процесса. [3, с. 8] Наиболее эффективной тактикой признавалось раннее выполнение ампутации после первичной хирургической обработки раны, что позволяло предупредить генерализацию инфекции и развитие травматического шока. Отказ от своевременной ампутации при наличии абсолютных показаний приводил к значительному увеличению послеоперационной смертности.

Объем медицинской помощи, выбор лечебных мероприятий и порядок эвакуации определялись не только хирургическими показаниями, но и общей боевой и медицинской обстановкой [1, с. 186]. В зимнее время наблюдалось значительное число отморожений, особенно III и IV степени, когда ввиду значительного некроза тканей ничего не оставалось, кроме как ампутировать пораженную конечность [2, с. 199].

При оказании хирургической помощи в военно-полевых условиях в течение всех лет войны возникали определенные трудности, связанные с недостаточностью научных данных об лечении инфекции и первоначальной нехваткой специализированных кадров. Сказывался и недостаток антибиотиков, поступавших в медицинские учреждения в небольшом количестве [2, с. 194]. Своевременно выполненная операция позволяла предотвращать развитие тяжелых осложнений, включая гангрену, анаэробную инфекцию, сепсис, а также полиорганную недостаточность, которые при отсутствии хирургического вмешательства почти неизбежно приводили к смерти.

Выводы. В результате исследования было выявлено что, ампутация конечностей нередко являлась единственным радикальным хирургическим вмешательством, способным предотвратить летальный исход при обширных поражениях конечностей, особенно с вовлечением инфекционного процесса. В условиях ограниченных возможностей своевременность и техническая корректность выполнения ампутации становились определяющими факторами выживаемости раненых, особенно в начале войны.

Список литературы

1. Евлоев, А. А. Организация и развитие хирургической помощи в годы Великой Отечественной войны: вклад в современную российскую хирургию / А. А. Евлоев, М. М. Нальгиев // Вестник Ингушского государственного университета. – 2025. – № 1. – С. 184-191.

2. Современный взгляд на принципы организации и развитие военно-полевой хирургии в условиях чрезвычайных ситуаций военного времени / П. М. Рабаданова, А. А. Аминова, И. А. Алимова, З. И. Баштукаева // Инновационное развитие: потенциал науки, бизнеса, образования : монография / под общ. редакцией Г. Ю. Гуляева. – Пенза : Наука и Просвещение, 2022. – С. 192-202.

3. Гладких, П. Ф. Медицинская служба Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / П. Ф. Гладких // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. – 2015. – № 4. – С. 5-20.

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Соляник К.А.

Гродненский государственный медицинский университет
г. Гродно, Республика Беларусь

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Горецкая М.В.

Актуальность. Вирусные гепатиты – инфекционные заболевания, которые могут приводить к тяжелым поражениям печени, надолго выводить бойцов из строя, что в годы Великой Отечественной войны сказывалось на боевой мощи армии и способности выполнять поставленные задачи. Понимание природы заболевания, путей передачи инфекции в рамках военных действий в определенных исторических условиях играет важную роль в изучении военной медицины.

Цель. Изучение причин возникновения и распространения вирусных гепатитов во время Великой Отечественной войны.

Методы исследования. Проведён анализ и обработка литературных источников, посвящённых эпидемиологии вирусных гепатитов в годы Великой Отечественной войны, изучены архивные данные о заболеваемости и противоэпидемических мероприятиях в Красной Армии.

Результаты и их обсуждение. В годы Великой Отечественной войны удалось избежать масштабных эпидемий, характерных для прошлых войн. Благодаря жестким санитарно-эпидемическим мерам, вакцинации и работе медиков, доля инфекционных заболеваний в Красной Армии не превышала 9 %. Вспышки инфекций возникали преимущественно в оккупированных районах, но эффективная работа санитарной службы предотвратила катастрофическое их распространение в войсках [1].

Гепатит активно регистрировался на фронтах. В годы войны вирусный гепатит был серьезной проблемой из-за скученности войск и трудностей