

дальнейшего развития, с другой – недостаточный уровень информированности населения в отношении существующих в нашей стране гибридных методов медицинской диагностики.

Литература

1. Рыжков, А. Д. Применение гибридных радионуклидных технологий визуализации и радионуклидной терапии у больных с остеогенной саркомой / А. Д. Рыжков, А. С. Крылов // Онкологический журнал: лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2024. – Т. 7, № 1. – С. 19–29. – DOI: 10.37174/2587-7593-2024-7-1-19-29.
2. Долгушин, М. Б. Роль радиологических методик и гибридного метода ПЭТ-МРТ в диагностике фармакорезистентной эпилепсии / М. Б. Долгушин, Т. М. Ростовцева // Медицина экстремальных ситуаций. – 2023. – № 3. – С. 21. – DOI: 10.47183/mes.2023.013.

РОЛЬ СЕМЬИ И БРАКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ПО МНЕНИЮ СТУДЕНТОВ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Гладкова А.А.

Научный руководитель: Синкевич Е.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Изменение и развитие общества, новые взгляды соответственно формируют и новое понимание семейных ценностей. Сегодня нравственные приоритеты родителей и детей значительно разнятся. Современное поколение молодёжи, к которому относится группа опрошенных лиц, обладает прогрессивным, но в тоже время более жёстким отношением к данной проблеме. Такая тенденция наблюдается ввиду того, что каждое последующее молодое поколение берет от предыдущего только самое необходимое, привносит в него собственные, актуальные в настоящее время, семейные обычаи и традиции. В связи с этим семейные национальные традиции и обычаи у молодежи стоят не на первом, и даже не на втором местах. Их обогнали образование, карьера, взаимоотношения с друзьями, пристрастия и т.д. Брак как союз женщины и мужчины, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Женщина и мужчина брачного возраста имеют право вступить в брак и создать семью на добровольных началах. Супруги имеют равные права в браке и семье. Женщинам и мужчинам обеспечиваются равные возможности в образовании и обучении, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и иных сферах деятельности, а также в создании условий для охраны их труда и здоровья.

Семья – это сообщество, основанное на браке супругов, помимо которых включает и их холостых детей (собственных и усыновленных), связанных духовно, общностью быта и взаимной моральной ответственностью.

Семья создается на основе брака, кровного родства, усыновления и удочерения, а также на других основаниях, не запрещенных законом, и таких, которые не противоречат моральным основам общества [1]. Настоящая здоровая семья не может быть создана только для удовлетворения материальной выгоды

и полового инстинкта. Основным объектом демографической политики всегда считалась молодая семья. От того, насколько успешны отношения между потенциальными супругами, зависит создание новых брачных союзов. Опираясь на все вышеперечисленное, были выделены цели и задачи научно-исследовательской работы.

Молодежь является «мобильной» частью общества, которая легко может адаптироваться к происходящим социальным переменам в государстве. Проходя этап своего становления, современная молодежь находится в условиях, где происходит формирование социальных отношений. Поэтому, изучение мнений современной молодежи о сущности семейных отношений, понимание того, какими ценностями она руководствуется и какие идеалы она несет, является актуальным вопросом.

Ценности, определяющие морально-нравственную основу личности, во многом задают тон и тип межличностных отношений и одновременно ими же и определяются, что имеет огромное значение в укреплении семейных уз. В связи, с чем является актуальным изучить, каким образом связаны между собой ценности личности и тип межличностных отношений [2].

Цель. Изучить отношение студентов к семейной жизни, преобладающие типы ценностей и форм межличностных отношений, а также установить имеющуюся между ними взаимосвязь. Объект исследования: студенты 2 курса педиатрического факультета Гродненский государственный медицинский университет (150 человек).

Материалы и методы исследования: Изучение и анализ литературных и информационных источников, добровольное анкетирование.

Результаты и их обсуждение. Проведенный опрос еще раз показал, что современное общество изменило свое отношение к браку и семье. Проанализировав данные проведенного анкетирования, выяснилось, что большинство студентов считают оптимальным возрастом для вступления в брак 23-27 лет для мужчин и 22-25 лет для женщин (соответственно 61 и 72%). Однако лишь 69% опрошенных считают, что брак – это союз людей на всю жизнь, в то время как 31% респондентов допускают многократное вступление в брак или затрудняются однозначно ответить на данный вопрос. Основными трудностями в семейной жизни, которые могут привести к распаду брачного союза, 62% студентов считают эмоциональную и психологическую несовместимость. По результатам опроса 78% – считают, что в организации семейной жизни большее участие должна принимать женщина, и лишь 28% – ответственность за семью возлагают на плечи мужчин.

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать следующий вывод: лишь 69% опрошенных считают, что брак – это союз людей на всю жизнь, – 72% респондентов допускают в качестве семейных отношений сожительство без регистрации в ЗАГСе или в церкви и 7% – не хотят иметь детей. Неумение студенческой молодежи правильно строить семейные отношения ведет к потери значимости в обществе семьи и брака, деформации семейных ценностей среди молодежи, переход от патриархальной семьи к нуклеарной, а также от детоцентристкой к эгалитарной.

Литература

1. Демографический ежегодник Республики Беларусь. 2020 / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. – 430 с.
2. Струневский, В. А. Отношение студентов к семье и браку / В. А. Струневский, К. Ю. Романенко // Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2022 : сб. материалов докл. LXXVI Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 20–21 апр. 2022 г. / под ред. С. П. Рубникова, В. А. Филонюка. – Минск, 2022. – С. 1073–1076.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО ТРОМБОЗА

Головач В.Ю.

Научный руководитель: Смирнова Г.Д., Якубчик А.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Острый мезентериальный тромбоз (ОМТ) характеризуется нарушением кровоснабжения в различных участках тонкой кишки, что приводит к ишемии и вторичным некротическим изменениям в ее стенке. Распространенность ОМТ составляет 0,09–0,2% от всех случаев острой хирургической госпитализации, но увеличивается с возрастом. В исследованиях за период с 1970 по 2013 год проводимых в странах с высоким уровнем дохода в среднем на 100 тыс. жителей ежегодно приходится 6,2 новых случаев ОМТ [1]. Акоста и др. [2] показали, что в обществе частота мезотромбоза резко возрастает с возрастом как у мужчин, так и у женщин, достигая 85,8 на 100 тыс. человек в возрасте 80–84 лет и 189,5 в возрасте старше 85 лет соответственно. Исследования, включенные в анализ заболеваемости среди населения в целом, показывают, что доля женщин значительно выше и составляет 58,3%. При отсутствии лечения смертность от него составляет около 50%. Ранняя диагностика и своевременное хирургическое вмешательство являются краеугольными камнями современного лечения, позволяющего снизить высокую смертность, связанную с этим заболеванием [3]. Проявления заболевания в большинстве случаев неспецифичны, и диагностика трудна из-за отсутствия патогномоничных симптомов в первые часы. При постановке диагноза учитывают клиническую картину заболевания: внезапную интенсивную боль в животе, рвоту и диарею, при позднем обращении – с примесью крови; также обращают внимание на факторы риска: сердечно-сосудистые заболевания (мерцательная аритмия, атеросклероз, гипертония), гиперкоагуляционные состояния. С особой настороженностью относятся к пациентам с проявлениями мультифокального атеросклероза и клиникой хронической мезентериальной ишемии в анамнезе, а также с синдромом гиперкоагуляции.

К основным лучевым методам диагностики относятся:

– обзорная рентгенография брюшной полости – позволяет выявить на фоне неравномерной пневматизации кишечника наличие горизонтальных