

вом уровне маркеров воспаления не наблюдалось. Медиана уровня NT-proBNP до выполнения кардиоверсии у пациентов с сохраненным синусовым ритмом составляла 227 (65; 358) пг/мл, а у пациентов с рецидивом ФП – 944 (652; 1339) пг/мл ($p < 0,01$). Для определения порогового значения уровня NT-proBNP был выполнен ROC-анализ. Площадь под кривой составила 0,88 (95% ДИ 0,76-0,99). Наиболее удаленная от диагонали точка на ROC-кривой соответствовала уровню NT-proBNP 469,5 пг/мл с чувствительностью 88,9% и специфичностью 89,5%.

Заключение. Значение уровня NT-proBNP $> 469,5$ пг/мл, измеренного перед проведением ЭИТ, является независимым предиктором рецидива фибрилляции предсердий с чувствительностью 88,9% и специфичностью 89,5%.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К МАТЕРИНСТВУ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Булко Д.О.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель – м.психол.н., Кузмицкая Ю.Л.

Актуальность. Психологическая готовность к материнству – важная проблема настоящего времени. Каждая женщина в своей жизни рано или поздно сталкивается с вопросом предстоящего материнства. Стать матерью – важный этап в жизни женщины и ее семьи. Однако в последние годы возраст, приходящийся на первые роды, увеличивается, а некоторые семьи и вовсе сталкиваются с проблемой невозможности иметь детей. Это связано с рядом социальных и психологических причин, среди которых особое место занимает психологическая готовность к материнству и сформированность материнской сферы. Стоит отметить неразработанность программ психологической помощи семье, и в первую очередь женщине. Постановка проблемы таким образом во многом определяет особую важность охраны материнства и детства. Охрана здоровья матери и ребенка – одно из приоритетных направлений в здравоохранении Республики Беларусь, имеющее особое медико-социальное значение.

Цель исследования: изучение психологической готовности к материнству. Задачи исследования: провести теоретический анализ готовности к материнству; установить стиль переживания беременности у девушек в юношеском возрасте, изучить особенности материнской сферы.

Материалы и методы исследования. Метод исследования: опрос. Методики исследования: проективная методика Г. Г. Филипповой «Я и мой ребенок». Выборка исследования: эмпирическую базу исследования составили девушки, учащиеся медико-психологического факультета УО «Гродненский государственный медицинский университет» в количестве 40 человек (возраст 19-21).

Результаты. По результатам проведённого эмпирического исследования выявлено, что преобладающим стилем является склонность к амбивалентности. Склонность к амбивалентности характерна для 53,3% опрошенных из полных и для 46,7% из неполных семей. Адекватный стиль представлен у 58,3% девушек из полных и у 41,7% девушек из неполных семей, тревожный стиль – (у 33,3% и 66,7%), отвергающий стиль был выявлен только у девушек из полных семей (11%).

Литература

1. Филиппова, Г. Г., Психология материнства: Учебное пособие. / Г. Г. Филиппова – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 240 с.
2. Овчарова, Р. В., Родительство как психологический феномен: учебное пособие. / Р. В. Овчарова – М.: Московский психолого-социальный институт, 2006. – 496 с.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ОСТРОГО АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ

Булко Д.О., Промчук И.Е.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., доцент Станько Э.П.*

Актуальность. Изучение проблемы патоморфоза клиники алкогольных психозов не потеряло своей актуальности по настоящее время. Металкогольные психозы представляют острые неотложные состояния вследствие длительного и систематического злоупотребления алкоголем [1]. Внимания заслуживает вариабельность клинической картины алкогольного делирия в зависимости от действия различных факторов [2]. Представляет интерес изучение клиники делирия в зависимости от пола и возраста, которые могут оказывать влияние на эффективность лечения и течение заболевания.

Цель исследования: дать сравнительную характеристику клиники алкогольного делирия у мужчин и женщин среднего возраста.

Материал и методы исследования. Обследованы 27 больных с алкогольным делирием, находившихся на лечении в отделении неотложной наркологии УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология». Средний возраст мужчин составил $43,7 \pm 0,75$ лет, женщин – $48,4 \pm 0,25$ лет. Основным методом исследования – клинико-психопатологический.

Результаты исследования. Длительность злоупотребления алкоголем составила у мужчин 17 лет с продолжительностью запоя 35 дней, у женщин – 14 лет с продолжительностью запоя 12 дней. В клинической картине алкогольного делирия слуховые галлюцинации доминирующими были у мужчин (38%), слуховые и зрительные галлюцинации – у женщин (50%), встречались с одинаковой частотой. Бредовые переживания наблюдались у 18,5% пациентов. Из них, у мужчин – в 14,8% случаев, у женщин – 3,2%. У мужчин нарушения мышления представлены бредом физическо-