

Лелевич В. В., Виницкая А. Г.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Беларусь

НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье проанализированы социально-эпидемиологические характеристики несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ, состоявших на наркологическом учете МЗ РБ в 2014 г. Распространение отдельных видов наркотиков в этой группе наркопотребителей имело выраженную возрастную зависимость.

Lelevich V. V., Vinitskaya A. G.

Grodno State Medical University,
Grodno, Belarus

PREVALENCE OF DRUG ABUSE AMONG UNDERAGE PEOPLE IN THE REPUBLIC OF BELARUS

The paper analyzed social and epidemiological characteristics of the minor drug abusers listed in the Narcological Register of the Ministry of Health of Belarus in 2014. The spread of particular drugs was shown to be depended upon the age of the registered drug abusers.

Согласно наблюдениям экспертов, подростковый (11-15 лет) и юношеский (16-18 лет) периоды считаются наиболее опасными для возникновения различных заболеваний, в том числе формирования зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) [1]. Эпидемиологический мониторинг наркологической ситуации в Беларуси свидетельствует о ежегодном «омоложении» контингента учтенных наркопотребителей, в том числе за счет несовершеннолетних учащихся различных учебных заведений [2].

Целью настоящего исследования явилась оценка распространенности наркопотребления среди несовершеннолетней молодежи Беларуси на основе анализа медицинской документации потребителей ПАВ, состоявших на учете в наркологических учреждениях республики в 2014 г.

Объектом исследования явились потребители наркотических и ненаркотических ПАВ, зарегистрированные на наркологическом учете МЗ РБ по состоянию на 1.01.2015 г. Анализ информации проводился по социально-эпидемиологическим и медицинским параметрам, которые рассчитывались из регистрационных карт наркопотребителей, поставленных и снятых с наркологического учета. Данные из регистрационных карт вводились в компьютер и подвергались статистической обработке.

Были проанализированы сведения о 832 потребителях ПАВ в возрасте от 7 до 17 лет, состоявших на учете в наркологических учреждениях республики на 1 января 2005 г. Это составило примерно 4,9% от общего числа учтенных потребителей наркотических и ненаркотических ПАВ (16975 человек). Среди наркопотребителей этой возрастной категории преобладали лица мужского пола – 705 мальчиков против 127 девочек. Подавляющее большинство несовершеннолетних (96%) были зарегистрированы на профилактическом учете с диагнозом «пагубное употребление ПАВ». Еще 33 подростков в возрасте 13-17 лет состояли на диспансерном учете с диагнозом синдрома зависимости от разных ПАВ.

Подробная характеристика несовершеннолетних наркопотребителей в зависимости от возраста и типа употребляемого ПАВ показана в таблице. В указанной группе молодежи наиболее распространенными ПАВ явились синтетические каннабиноиды в составе курительных смесей (42,8%), ингалянты (41,5%), и в меньшей степени каннабиноиды растительного происхождения (марихуана), психостимуляторы группы амфетамина («экстази»), инъекционные наркотики. Предпочтения разных видов ПАВ зависели от возраста исследуемых детей и подростков (таблица).

Таблица – Распределение несовершеннолетних наркопотребителей, состоявших на наркологическом учете МЗ РБ на 1.01.2015 г., по возрасту и виду употребляемого психоактивного вещества (ПАВ)

Основные категории ПАВ	Возраст наркопотребителей, лет				
	7-10	11-13	14-15	16-17	Всего
<i>Потребители всех видов ПАВ, в т. ч.</i>	3	50	213	566	832
Опиатов	0	0	0	12	12
Каннабиноидов*	1	7	95	179	282
Ингалянтов	2	37	100	206	345
Психостимуляторов группы амфетамина	0	0	1	9	10
Галлюциногенов, седативных препаратов, транквилизаторов, других ПАВ	0	6	16	37	69
Курительных смесей типа «Спайс»**	1	7	89	259	356

Примечание – * – включая случаи употребления синтетических и растительных каннабиноидов; ** – включая случаи сочетанного употребления курительных смесей с другими ПАВ

Самым младшим из них исполнилось 7, 8 и 9 лет на момент постановки на наркологический учет. В указанных 3-х случаях основанием обращения в наркологическое учреждение явились информация родственников и инспекций по делам несовершеннолетних районных отделов внутренних дел. В 2-х случаях имело место злоупотребление ингалянтами, в 1-м – употребление курительных смесей.

Среди 11-13-летних подростков преобладали лица с диагнозом «пагубное употребление летучих растворителей» (МКБ-10: F17.1). В двух случаях основанием постановки на учет явилась зависимость от ингалянтов (МКБ-10: F17.2). Другие наркопотребители этой возрастной группы злоупотребляли курительными смесями типа «Спайс», а также растениями, содержащими галлюциногенные вещества (дурман) (таблица).

Начиная с 2012 г. на наркотическом рынке Беларуси стали распространяться курительные смеси (миксы), обработанные структурными аналогами известных наркотиков. В составе этих миксов определялись химические соединения серий JWH и CP, превосходящие по силе природные алкалоиды конопли. Если в 2010–2012 гг. количество выявленных потребителей курительных смесей составляло 4-7 человек, то на конец 2014 г. на наркологическом учете в Беларуси состояло уже 1369 потребителей этих дизайнерских наркотиков [3].

Анализ информации наркологической службы МЗ РБ согласуется с данными социологических исследований [1], согласно которым 14-16-летние подростки подвержены «экспериментированию» с употреблением различных психоактивных веществ. Так, в группе 14-15-летних подростков, состоявших на учете в 2014 г., основными употребляемыми ПАВ являлись ингалянты (46,9%) и каннабиноиды (44,6%). Обращает внимание высокий удельный вес 14-15-летних потребителей курительных смесей – 41,7%, в сравнении с наркопотребителями младших возрастов.

Самой многочисленной группой несовершеннолетних на наркологическом учете явились 16-17-летние молодые люди. Здесь преобладали потребители ингалянтов (36,4%) и курительных смесей (45,8%). Обращает внимание появление среди них потребителей инъекционных наркотиков – опиатов и нового синтетического наркотика МДПВ (3,4-метилендиоксипировалерон).

Таким образом, анализ информации свидетельствует о существенных различиях в уровне распространенности отдельных ПАВ в детей и подростков.

1. Группа детей и подростков моложе 14 лет характеризуется преобладанием потребления ингалянтов и каннабиноидов, и в меньшей степени других психоактивных веществ.

2. Для подростков 14-17 лет характерно экспериментирование с разными видами ПАВ и разными способами приема наркотиков, включая ингалянты, курительные смеси и инъекционные наркотики.

3. Представленные данные могут быть полезными при разработке лечебно-профилактических мероприятий, а также при формировании государственной политики в области зависимости от наркотиков.

Литература:

1. Профилактика употребления наркотических средств и психоактивных веществ учащимися общеобразовательных школ и ПТУ: учебное пособие для педагогических работников общеобразовательных школ и ПТУ / Ю.А. Быкадоров [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 187.

2. Гендерные и возрастные аспекты распространенности наркоманий в Республике Беларусь / В.В. Лелевич, [и др.]. // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2015. – Т. 14, № 2. – С. 7-13.

3. Веницкая, А.Г. Эпидемиология «дизайнерских» наркотиков в Республике Беларусь / А.Г. Веницкая, В.В. Лелевич, Ю.В. Сарана // Медицинские новости. – 2016. – № 11. – С. 52-55.

Любов Е.Б.

Московский научно-исследовательский институт психиатрии –
филиал Национального медицинского исследовательского центра
психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского
Министерства здравоохранения Российской Федерации

КАЧЕСТВО СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ О СУИЦИДАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКОВ

Актуальность. СМИ оказывают двоякий эффект на суицидальное поведение (СП): непрофессиональные – способствуют подражательному СП уязвимых подростков, ответственные – служат антисуицидальным фактором как обучающий и информационный ресурс. Проблемы повышения качества сообщений СМИ привлекают все большее внимание и в нашей стране [Е.Б. Любов, 2013, 2014].

Цель и задачи работы. Анализ качества сообщений электронных СМИ о СП подростков.

Материалы и методы. Проведен невыборочный анализ качества (по критериям ВОЗ) более 2000 сообщений электронных СМИ о СП населения во всех субъектах РФ в 2016 г.