

пуктурой» (Parisinthefspring, asnakeinthegrass, akickintherear, awoodenface) – 40%.

Выводы. Использование метамоделей в психотерапии имеет множество свойств, которые коренятся в ее семиотической природе: слияние в ней образа и смысла; контраст с обыденным обозначением сущности предмета; категориальный сдвиг; актуализация ассоциаций; несводимость к буквальному перефразированию; синтетичность и размытость, диффузность значения; допущение разных интерпретаций, отсутствие мотивации; апелляция к воображению или интуиции; выбор кратчайшего пути к сущности объекта. Все эти характеристики находят применение в той спонтанной, почти неуловимой и одновременно целесообразной игре личностных смыслов и значений, которая и составляет динамику психотерапевтического процесса.

ПРИЧИНЫ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ

Кислая И.М.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Егорова Т.Ю.*

Актуальность. Бесплодие-отсутствие беременности при регулярной половой жизни без применения контрацептивов в течении одного года. В Беларуси не могут зачать ребенка около 15% супружеских пар. Соотношение женского и мужского бесплодия 40% и 30%, соответственно. Еще в 30% случаях «виноваты» оба. Выделяют бесплодие первичное-при отсутствии в анамнезе женщины беременностей и вторичное-невозможность наступления повторной беременности.

Цель исследования: изучить наиболее частые причины женского бесплодия.

Методы исследования. Изучены 98 амбулаторных карт женщин с диагнозом бесплодие, наблюдающихся в поликлинике УЗ Гродненского областного клинического перинатального центра.

Результаты. Средний возраст женщин составил 31 год (от 19 до 47 лет), чаще наблюдается у женщин от 30-34 лет – 49 (50%), от 26-29 – 24 (24,4%), от 19-25 – 12 (12,2%). Первичное бесплодие встречается у 62 (63,2%), вторичное – 36 (36,7%). Роды у 20 женщин (20,4%), выкидыши – 11 (11,2%), внематочная беременность 5 (5,1%). Из анамнестических данных позднее наступление менархе (15 лет и старше) у 9 (9,1%). Наиболее часто диагностировалось смешанное бесплодие – 58 (57,3%), эндокринное – 21 (19%), трубно-перитонеальное – 8 (10,7%), неуточненное – 7 (7,3%), маточное – 3 (2,9%), мужской фактор – 1 (1,4%). Гинекологические операции перенесли 28 женщин: на яичниках – 14 (20,5%), на трубах – 9 (13,2%), на матке – 5 (7,3%). Гинекологические заболевания диагностированы у 53 женщин, чаще наблюдается: эрозия шейки матки – 29 (29,5%), ИППП – 20 (29,4%), аднекситы – 12 (12,4%), кисты яичников – 6 (8,8%), миома матки –

3(4,4%). Экстрагенитальные заболевания диагностированы у 43 женщин, из них простудные – 28(41%), хр.тонзилит – 5(7,3%), гипотериоз – 3(4,4%), артериальная гипертензия, хр. Гастрит. – 2(2,9%).

Выводы. Наиболее часто причиной первичного бесплодия являются эндокринные нарушения, а вторичного бесплодия-перенесенные гинекологические операции(28%) и воспалительные процессы(41%). Эндокринные причины бесплодия в обеих группах составляют 21%.

Литература

1. Савельева, Г.М. Гинекология/ Г.М. Савельева, В.Г.Бреусенко // Москва-2012-110с.

2. Серов, В.Н., Прилепская В.Н., Овсяникова Т.В Гинекологическая эндокринология //Москва, 2008

КАТАСТРОФА XXI ВЕКА: ОТРАВЛЕНИЕ СПАЙСАМИ

Кита М. Г.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель — к.м.н., доцент Ивашич В.М.

Актуальность. Статистика говорит в пользу роста популярности спайсов. Стоит учесть, что употребляют синтетические наркотики преимущественно люди молодого возраста, а значит они прекрасно осведомлены о вреде, ведь статьи в Интернете они, как минимум, видят, а как максимум - внимательно читают и даже обсуждают на форумах.

Цель работы: выяснить влияние наркотических курительных смесей на здоровье и психическое развитие современного общества.

Задачи. Изучить данные статистики РБ по заболеваемости населения наркоманией и токсикоманией.

Методы исследования. Метод теоретического анализа, сравнительный.

Результаты исследований. Практически все курительные смеси обладают длительным токсическим воздействием на организм и выраженным психотропным эффектом. Последствиями употребления спайсов являются: быстрое появление зависимости, серьезные поражения ЦНС, расстройства психики, вплоть до шизофреноподобного распада личности, резкое ухудшение работы иммунной системы, негативное влияние на репродуктивную функцию, серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, отравления, смерть от передозировки. При передозировке синтетическими наркотиками сначала развиваются длительные галлюцинации. Чаще всего жертва наркотика видит устрашающие картины, вызывающие ужас и панические реакции. После лихорадочной двигательной активности наступает фаза заторможенности. В это время появляются следующие симптомы: учащение сердцебиения, многократная рвота, повышение давления. Кроме того, к органам начинает поступать недостаточно кислорода, что вызывает сбои в их работе, ослабляется и урежается дыхание, происходит потеря