

3(4,4%). Экстрагенитальные заболевания диагностированы у 43 женщин, из них простудные – 28(41%), хр.тонзилит – 5(7,3%), гипотериоз – 3(4,4%), артериальная гипертензия, хр. Гастрит. – 2(2,9%).

Выводы. Наиболее часто причиной первичного бесплодия являются эндокринные нарушения, а вторичного бесплодия-перенесенные гинекологические операции(28%) и воспалительные процессы(41%). Эндокринные причины бесплодия в обеих группах составляют 21%.

Литература

1. Савельева, Г.М. Гинекология/ Г.М. Савельева, В.Г.Бреусенко // Москва-2012-110с.

2. Серов, В.Н., Прилепская В.Н., Овсяникова Т.В Гинекологическая эндокринология //Москва, 2008

КАТАСТРОФА XXI ВЕКА: ОТРАВЛЕНИЕ СПАЙСАМИ

Кита М. Г.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель — к.м.н., доцент Ивашич В.М.

Актуальность. Статистика говорит в пользу роста популярности спайсов. Стоит учесть, что употребляют синтетические наркотики преимущественно люди молодого возраста, а значит они прекрасно осведомлены о вреде, ведь статьи в Интернете они, как минимум, видят, а как максимум - внимательно читают и даже обсуждают на форумах.

Цель работы: выяснить влияние наркотических курительных смесей на здоровье и психическое развитие современного общества.

Задачи. Изучить данные статистики РБ по заболеваемости населения наркоманией и токсикоманией.

Методы исследования. Метод теоретического анализа, сравнительный.

Результаты исследований. Практически все курительные смеси обладают длительным токсическим воздействием на организм и выраженным психотропным эффектом. Последствиями употребления спайсов являются: быстрое появление зависимости, серьезные поражения ЦНС, расстройства психики, вплоть до шизофреноподобного распада личности, резкое ухудшение работы иммунной системы, негативное влияние на репродуктивную функцию, серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, отравления, смерть от передозировки. При передозировке синтетическими наркотиками сначала развиваются длительные галлюцинации. Чаще всего жертва наркотика видит устрашающие картины, вызывающие ужас и панические реакции. После лихорадочной двигательной активности наступает фаза заторможенности. В это время появляются следующие симптомы: учащение сердцебиения, многократная рвота, повышение давления. Кроме того, к органам начинает поступать недостаточно кислорода, что вызывает сбои в их работе, ослабляется и урежается дыхание, происходит потеря

сознания и клиническая смерть в самых тяжелых случаях. По данным Национального статистического комитета РБ, в период 2010 по 2014 год наблюдается снижение уровня заболеваемости наркоманией и токсикоманией. По данным на 2014 год, количество пациентов с впервые установленным диагнозом составило 15,1 на 100 000 человек. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в г. Минске, на втором месте находится Гродненская область, самые низкие показатели заболеваемости зарегистрированы в Брестской области.

Выводы. Разрушительные последствия спайсов изучены не до конца. Так как наркотик появился недавно, нельзя точно сказать, какие изменения ожидают организм через 15-20 лет. Однако уже сейчас понятно, что курение смесей не пройдет безболезненно и последствия будут самыми печальными.

Литература

1. Зобнин Ю.В., Стадлер Е.М. Острые отравления синтетическими каннабиноидами. Сибирский медицинский журнал. 2014 № 8. С.130-135.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Китель С.О.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель - к.филол.н., доц. Кондратьев Д.К.*

Объектом проводимого исследования являются, в широком аспекте, немецкие и русские клинические термины, включающие в свой состав греко-латинские терминологические элементы, и в узком аспекте – конечные греко-латинские терминоэлементы. Медицинская клиническая терминология, по самым разным оценкам, насчитывает до 60 тысяч терминов, количество греко-латинских терминологических элементов составляет свыше 1500, количество конечных терминоэлементов превышает 90.

Цель данного исследования – проведение полной инвентаризации немецких и русских конечных греко-латинских терминоэлементов и их сравнительного лексико-семантического анализа.

В проведенном исследовании использованы описательный метод, метод инвентаризации и анализа. Для описания количественных характеристик медицинских терминов использован метод математической статистики.

Материалом исследования явились основные словари медицинских терминов, используемые в отечественной и немецкой медицинской практике: Pschyrembel Klinisches Wörterbuch (Berlin : de Gruyter)- 1735 страниц, около 60 тысяч немецких медицинских терминов, и Энциклопедический