

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Лелевич С.В., Разводовский Ю.Е.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Центр мониторинга за наркотиками и наркопотреблением
230009, г. Гродно, ул. Горького, 80, Беларусь
E-mail: vinitskaya@tut.by

Статья поступила 31.01.2013

В работе представлено описание некоторых аспектов наркологической ситуации в Республике Беларусь на основе анализа официальных данных наркологической службы Министерства здравоохранения республики о лицах, состоявших на наркологическом учете в 2007-2011 гг. За последние пять лет в Беларуси произошло повышение численности учетных потребителей психоактивных веществ (ПАВ) на 25%. Проведенные исследования свидетельствуют о значительно меньших масштабах распространенности наркопотребления среди населения Беларуси, по сравнению с Российской Федерацией. Общими особенностями контингентов наркопотребителей обеих стран являются преобладание инъекционного способа потребления наркотиков, преимущественное распространение опийных наркотиков, и в меньшей степени — каннабиноидов, ингалянтов, и других ПАВ.

Ключевые слова: наркологическая ситуация, психоактивные вещества, Беларусь, распространенность наркопотребления

В странах СНГ злоупотребление наркотиками является одной из самых острых медико-социальных проблем, учитывая растущую численность наркопотребителей. В этой связи мониторинг наркологической ситуации является актуальной задачей эпидемиологических исследований, поскольку, не располагая данными о современных тенденциях в области наркопотребления и незаконного оборота наркотиков, сложно разрабатывать и реализовывать профилактические мероприятия [2].

В Беларуси различные аспекты наркологической ситуации параллельно оцениваются наркологической службой Министерства здравоохранения и Министерством внутренних дел республики. Ежегодно в этих ведомствах собирается и анализируется информация о выявляемых потребителях психоактивных веществ (ПАВ), об особенностях распространения в республике отдельных наркотиков. Эпидемиологический контроль над распространностью наркоманий осуществляют Центр мониторинга за наркотиками и наркопотреблением Гродненского государственного медицинского университета (ГрГМУ), в котором с 1992 г. поддерживается республиканская компьютерная база данных по-

потребителей наркотических и ненаркотических ПАВ, регистрируемых наркологическими учреждениями. Эти сведения позволяют представить приблизительную картину изменения наркологической ситуации в республике за определенный временной период.

Целью настоящего исследования явилась оценка некоторых аспектов распространенности потребления ПАВ в Беларуси в 2007-2011 гг. на основании анализа статистических данных наркологической службы Министерства здравоохранения Республики Беларусь (МЗ РБ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования явились пациенты с синдромом зависимости от ПАВ (МКБ-10: F 11.2-F.16.2, F18.2-F 19.2) и лица, с пагубным их употреблением (МКБ-10: F 11.1-F.16.1, F18.1-F 19.1), зарегистрированные на наркологическом учете МЗ РБ в 2007-2011 гг. Анализ информации о потребителях ПАВ проводился по социально-эпидемиологическим и медицинским параметрам, которые рассчитывались из регистрационных карт наркопотребителей, впервые выявленных и снятых с учета в наркологических учреждениях республики. Данные из регистрационных карт вводились в компьютерную базу данных и подвергались статистической обработке.

На основании полученных данных были рассчитаны сводные показатели потребления всех видов ПАВ: «Распространенность потребления ПАВ» (суммарное количество всех состоящих на учете больных синдромом зависимости от наркотических и ненаркотических ПАВ и лиц, с пагубным употреблением ПАВ, в пересчете на 100 тыс. населения) и первичная заболеваемость (количество наркопотребителей, зарегистрированных в отчетном году на 100 тыс. населения). Для расчета этих показателей были использованы сведения Национального статистического комитета Республики Беларусь о народонаселении республики и ее регионов [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По данным Центра мониторинга за наркотиками и наркопотреблением ГрГМУ на 1 января 2012 г. на учете в наркологических учреждениях Беларуси состояли 13 149 потребителей наркотических и ненаркотических ПАВ. В 2011 г. среднереспубликанский показатель «Распространенности потребления ПАВ» составил 138,0 человек на 100 тыс. населения, и увеличился в 1,3 раза по сравнению с уровнем 2007 г. (109,8) (рис. 1). Согласно результатам предыдущих исследований [5–7], ежегодный рост выявления новых случаев наркопотребления в Беларуси отмечается с 1990-х гг. Так, в 1996 г. на учете в наркологических учреждениях Беларуси состояло всего 3144 потребителей ПАВ, или 47,1 человек на 100 тыс. населения республики [7]. Следовательно, за 1996–

2011 гг. общее число зарегистрированных наркотиков в Беларусь увеличилось в 4,2 раза, а показатель «Распространенности потребления ПАВ» в 3 раза превысил соответствующий показатель 1996 г.

Употребление наркотиков в Беларусь является больше «мужским феноменом». Так, в 2011 г. среди потребителей ПАВ, зарегистрированных в наркологических учреждениях республики, 84,3% составили мужчины, 15,7% — женщины. Суммарное количество учтенных мужчин-наркотиков на 100 тыс. мужского населения Беларусь составило 252,2 человека. Для женщин этот показатель составил 40,6 наркотиков на 100 тыс. женского населения. Таким образом, в Беларусь на 6 официально зарегистрированных мужчин-наркотиков приходится примерно 1 женщина [6].

В 2011 г. возрастной диапазон наркотиков, состоящих на наркологическом учете МЗ РБ, колебался в широких пределах: от 8-летних детей до 60–70-летних пенсионеров. Однако в целом по Беларусь в контингенте потребителей наркотиков преобладали молодые и трудоспособные люди в возрасте от 20 до 39 лет. В этой возрастной группе населения суммарный показатель распространенности наркотиков составил примерно 176 потребителей ПАВ на 100 тыс. населения в возрасте 20–39 лет [6]. Для сравнения в 2007 г. в Российской Федерации самый высокий показатель учтенной распространенности наркоманий был также




Рис. 1. Динамика численности потребителей отдельных видов ПАВ (на 100 тыс. населения), состоящих на наркологическом учете МЗ РБ в 2007–2011 гг.



Рис. 2. Возрастной состав наркопотребителей, состоящих на профилактическом и диспансерном наркологическом учете МЗ РБ в начале 2012 г.

рассчитан для группы населения в возрасте 20–39 лет, и составил 684,1 человека на 100 тыс. населения соответствующего возраста [3].

В 2011 г. среди лиц, состоящих на наркологическом учете в Беларуси, диагноз синдрома зависимости от ПАВ имели 50,6% учтенных наркопотребителей. Соотношение лиц, состоящих на диспансерном и профилактическом учетах, варьировало в разных возрастных группах наркопотребителей (рис. 2). Так, наименьшее число наркозависимых имелось среди молодых наркопотребителей в возрасте до 25 лет. По данным за 2011 г. всего 1,6% учтенных потребителей ПАВ в возрасте 10–14 лет состояли на диспансерном учете. Среди 15–19-летних наркопотребителей удельный вес наркозависимых составлял 11,9%, среди 20–24-летних — 29%. Подавляющее большинство наркозависимых в Беларуси были старше 25 лет. В 2011 г. удельный вес наркозависимых в старших возрастных группах потребителей ПАВ варьировал от 42,6% среди лиц в возрасте от 25–29 лет до 66,7% среди 35–39-летних (рис. 2).

Согласно имеющимся данным, в Беларуси наиболее активные наркопотребители используют инъекционный способ введения одного или нескольких видов наркотиков [1, 5–7]. Причем ежегодно на наркологическом учете регистрируется все больше потребителей инъекционных наркотиков (ПИН). Раннее, нами был использован метод «повторного захвата» (capture-recapture method) для оценки общей численности ПИН в Беларуси. В результате расчетов в начале 2011 г. примерная

численность ПИН в Беларуси составила 81 386 человек (74 400–88 400), что составило примерно 1,2% (1,1–1,3%) населения республики в возрасте 15–64 лет. Следовательно, в Беларуси на одного выявленного ПИН может приходиться примерно 6 незарегистрированных [1].

В начале 2012 г. на наркологическом учете МЗ РБ состояло 8721 ПИН, что составило 66,3% от всего контингента наркопотребителей (62,9% в начале 2008 г.) [6]. Среди ПИН, 5719 человек (65,6%) состояли на диспансерном учете; 3002 человек (34,4%) с небольшим стажем наркопотребления были зарегистрированы на профилактическом учете. Еще 433 наркопотребителей, или 3,3% употребляли несколько видов ПАВ, включая инъекционные наркотики и другие ПАВ.

В сравнении с официальными данными наркологической службы Российской Федерации (РФ), наркологическая ситуация в Беларуси выглядит не столь драматично. Так, в 2011 г. в специализированных наркологических учреждениях РФ состояло на учете 339,3 тыс. больных наркоманией, или 237,5 в расчете на 100 тыс. населения. Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков в 2011 г. составило 533 404 человек (373,4 на 100 тыс. населения); потребителей ненаркотических веществ — 30 117 человек, (21,08 на 100 тыс. населения). Среди наркозависимых в РФ подавляющее большинство составили потребители опийных наркотиков — 85,6%, второе ранговое место заняли больные с зависимостью от каннабиноидов — 6,8%, остальные употребляли другие наркотики и их сочетания. Удельный вес больных с синдромом зависимости от ПАВ составил всего 1,4% [4, 9].

В Беларуси, по данным за 2011 г., на учете в наркологических учреждениях преобладали потребители опийных наркотиков (68,1%), 15,3% употребляли каннабиноиды и 8,5% ингалянты. В гораздо меньшей степени встречалось выявление потребителей психостимуляторов (3,6%), седативных и снотворных препаратов (2,6%), галлюциногенов (1,2%), других ПАВ (0,5%).

За все годы наблюдения в Беларуси потребители опиоидов составляли наибольшую часть контингента лиц, регистрируемых на наркологическом учете и обращающихся за медицинской помощью в наркологические учреждения [5, 6]. В 2011 г. суммарный показатель распространенности потребления опийных наркотиков оказался максимальным среди всех ПАВ и составил 94,7 человек на 100 тыс. населения республики. За последние 5 лет показатель распространенности потребления опийных наркотиков увеличился в 1,4 раза по сравнению с уровнем 2007 г., тогда как распространенность потребления каннабиноидов увеличилась в 1,3 раза (рис. 1).

Большинство потребителей опийных наркотиков употребляли экстракционный опий, изготавляемый из соломы и семян растений рода Papaver. В 2011 г. среди лиц, состоящих на наркологическом учете, удельный вес потребителей экстракционного опия составил 54,5%. В меньшей степени, регистрировались случаи потребления героина (6,4%), нелегального метадона (4,2%), морфина (2,8%), кодеина (0,6%), других синтетических опиоидов.




Рис. 3. Показатели первичной заболеваемости потребителей отдельных видов ПАВ в Беларуси в 2007–2011 гг.

Второй по распространению группой наркотиков оказались каннабиноиды — марихуана, гашпи, продукты, содержащие синтетические каннабиноиды. В 2011 г. средний по республике показатель распространенности потребления каннабиноидов составил 21,2 человек на 100 тыс. населения и увеличился в 1,3 раза по сравнению с уровнем 2007 г. (рис. 1). В остальных случаях среди лиц, состоящих на учете в начале 2012 г., были распространены ингалянты (8,5%), психостимуляторы (3,6%), седативные и снотворные препараты (2,3%), галлюциногены (1,2%), другие ПАВ (0,5%).

Во все годы наблюдения, в Беларуси наибольшую роль в выявлении потребителей ПАВ играли правоохранительные органы (милиция, инспекция по делам несовершеннолетних, исправительно-трудовые учреждения и др.), а также лечебные учреждения системы здравоохранения республики [5–7]. В 2011 г. основная часть учтенных наркопотребителей была зарегистрирована после предоставления информации правоохранительных органов — 48,8%. В меньшей степени выявление потребителей ПАВ происходило по информации лечебных учреждений (18,8%), после самостоятельного обращения (16,4%), или по другим причинам.

Наиболее значимым показателем, характеризующим проблему распространенности злоупотребления различными ПАВ, является уровень первичной заболеваемости [9]. В 2011 г. на наркологическом учете МЗ РБ было зарегистрировано 2629

новых потребителей ПАВ, а показатель первичной заболеваемости потребителей всех видов ПАВ составил 27,8 человек в расчете на 100 тыс. населения. За последние пять лет первичная заболеваемость наркоманиями в Беларуси увеличилась в 1,4 раза, в сравнении с 2007 г. (20,2) (рис. 3), и в 3,8 раз — по сравнению с показателем 1995 г. (7,3) [7]. Обнаружено, что основной причиной роста выявления новых потребителей наркотиков явилось распространение опийных наркотиков. Так, в 2011 г. показатель первичной заболеваемости опийной наркомании в Беларуси был самым высоким в республике и составил 17,4. За последние пять лет количество потребителей этих наркотиков среди впервые выявленных наркопотребителей увеличилось в 1,7 раза, а потребителей каннабиноидов — в 1,5 раза (рис. 3).

Таким образом, за последние 5 лет в Республике Беларусь был отмечен умеренный (на 25%) рост количества учтенных наркопотребителей. В структуре официально зарегистрированных потребителей ПАВ преобладали потребители опийных наркотиков, доля которых постепенно увеличивалась, и достигла 68,1% в 2011 г. Далее, по уменьшению частоты потребления располагались каннабиноиды, ингалянты, психостимуляторы, седативные и снотворные препараты, галлюциногены, другие ПАВ. Проведенные исследования свидетельствуют о значительно меньших масштабах распространенности наркопотребления среди населения Беларуси, по сравнению с РФ. Тем не менее прозрачность границ и высокие темпы миграции населения способствуют формированию общих тенденций и особенностей наркопотребления в этих странах. К ним относятся преобладание опийных наркотиков и инъекционного способа употребления ПАВ, преимущественное приобщение к ПАВ мужчин, и молодых людей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виницкая А.Г., Разводовский Ю.Е., Лелевич В.В. Оценка численности инъекционных потребителей наркотиков в Беларуси с использованием метода повторного захвата // Вопросы наркологии. — 2011. — № 5. — С. 4650.
2. Головко А.И. Эпидемиологические аспекты в наркологии (обзор литературы) // Наркология. — 2006. — № 7. — С. 1727.
3. Киржанова В.В. Основные тенденции учтенной заболеваемости наркологическими расстройствами в России в 2006–2007 гг. // Вопросы наркологии. — 2008. — № 6. — С. 5366.
4. Кошкина Е.А. Заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, в Российской Федерации в динамике за 5 лет // Вопросы наркологии. — 2011. — № 1. — С. 1727.
5. Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Лелевич С.В., Разводовский Ю.Е., Максимчук В.П., Медведев Д.А. Наркопотребление и незаконный оборот наркотиков в Республике Беларусь в 2007 г. — Минск: Белсенс, 2011. — 70с.

6. Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Разводовский Ю.Е., Лелевич С.В. Региональные особенности наркологической ситуации в Республике Беларусь. — Гродно: ГрГМУ, 2012. — 168 с.
7. Лелевич В.В., Козловский А.В., Виницкая А.Г., Максимчук В.Д. Наркопотребление и незаконный оборот наркотиков в Республике Беларусь. — Минск: Альтиора, 2006. — 46 с.
8. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Здравоохранение в Республике Беларусь: Официальный статистический сборник за 2010 г. — Минск: РНМБ, 2011. — 305с.
9. Кошкина Е.А., Киржанова В.В., Сидорюк О.В., Ваникова Н.Г., Григорова Н.И., Бобков Е.Н. Основные показатели деятельности наркологической службы в 2011 г. — М.: ННЦ наркологии МЗиС РФ, 2012. — 38 с.

Репозиторий ПГУ